

醫

案

醫案新都治驗四卷目錄

孫子元瘡後沐浴鼻出紅涕面足浮腫一

一婦食積痰飲瘀血流於下部左跨臍腹脹痛

恒宇令堂右肩筋攣腫痛三

孫君錫頭痛胸背脹飲食作吐咳嗽四

孫尔嘉內人三姪而三小產五

孫薇垣內人咳唾紅痰六

戴萬奇丈中痰後兩手足不能動七

族學人內脊頭痛玉戶撮急肛門逼迫遍身皆疼

梓林兄內眷右手痛風小水頻迫九

一婦經閉三月洩瀉嘔雜吐酸十

程氏婦下午喉痛痰多暈厥十一

汪銀兄時疫熱病汗出不止十二

何明吾時疫食復不省人事循衣摸床十三

孫元素春溫食復發斑十四

孫安飢勞感疫食復發斑十五

一人喉痛夜卧氣壅面足浮腫十六

何洗心虛寒腎洩十七

程湘孫人鼻衄後眩運嘈雜嘔吐清水十八

孫君孝春溫誤作陰虛治十九

一僕婦頭疼喉痛咳嗽嘔惡胸膈作脹二十

族侄婦范氏乳癰二十一

表侄女黃氏姪七月患血痢二十二

程氏婦小產後患赤痢二十三

孫竹埜受暑作吐又傷酒麵身黃成疸二十四

程菊泉暑月喘嗽二十五

程應禎兄咳吐紅痰胸背脹痛眩運二十六

虛山內人胸脇脹痛五更嘈雜 二十七

一婦暑月小便不利至戶腫大便秘血 二十一

弟婦戴氏臍腹痛白帶如注裏急後重下痢赤白

族弟應童胃脘當心而痛 二十

弟淑南三陽合病暑症 三十一

一富婦轉脘 三十一

文約孺人八十三胃脘痠痛 二十八

息童弟三陽瘡 三十四

程好吾春溫 三十五

程氏婦屍從子尸出 三十六

張子應章之弟十月發三陽瘡 三十七

吳中岳孺人痰後壞症 三十八

鮑子五保時疫耳聾洩瀉 三十九

僕子孫守中麻後咳嗽無痰唇厚聲啞 四十

僕子得貴春溫頭痛 四十一

五素侄令政春溫後經水適止 四十二

朱氏子天送時疾頭疼身若燔炭 四十三

朱桃源內人胃脘痛常苦夢遺經水一月兩至 四十四

桂事火見痰積痰血作痛

四十五

熊二官疫後食復

四十六

室弟東里內子咳嗽吐紅

四十七

桂竹坡內人年六十瘟疫昏憤

四十八

程內春新寡七日染疫適值夢洩神昏譫語

四十九

太學從明滯下純血

五十

查少川喘後腫脹

五十一

夏益吾肢節腫痛手足癢痛腫尤甚

五十二

初陽徑內人肺癰

五十三

木內人氣喘作脹

五十四

侄孫女十歲大便脫肛鼻中出血

五十五

唐岩祈患痢赤白腹脹氣喘四肢冷陰囊腫

六十五

侄婿程東山患休息痢下皆紫血

五十七

陳氏婦腸鳴腹痛合目汗出下午潮熱

五十八

九德侄耳鳴

五十九

陳覺字上盛下虛合目訛語痰火吼喘

六十

程紹溪中年患鶴膝風

六十一

堂嫂程氏喉間有物如嚙咬之不出嚙之不下

六十二

一婦產後咳嗽發熱咳出之痰色黑而臭六十二
表嫂孀居二十年右癱不能舉動神情恍惚亂言
多悲泣六十四

桂亭大兄墜轎後腰脇脹痛六十五

堂嫂王氏吐紫黑血塊足跟掀腫痒痛六十六

堂婦程氏姙五月痢下膿血六十七

嫂汪氏頭痛遍身痛痢下赤白六十八

仲閣氣虛中滿六十九

朱懷竹楊梅毒氣內攻上迫於肺將成肺癰下流

陰囊囊潰見子

七十

查良本令春每飲食悉從背後而下

七十一

後溪大兄孺人戴氏患血痢

有發明
七十二

邵敬園廼眷胃腕痛

七十三

賴望臺患瘰

有發明
七十四

汪氏姬寒痰壅滯

七十五

徐客兄子筋痿

風

七十六

邵老封君手足麻而無力

七十七

程巢父廼即痢後風

有發明
七十八

葉潤心耳嘈雜好啖肉尤好雞腹太痛虫症也

程相如令政孕七月患痢

八十

程曉山中風先兆

廼即麻後痺症

八十一有發明

一婦疫後虛寒

十三

從獻長郎七歲患痢痢後成痺

八十四有發明

侄孫子忠痢下紅膿如爛魚腸腹大痛日夜百次

元素內人雙胎難產

治奇五

邵馬兄患嘔吐所出皆如爛猪肺

八十六

許卓峰上吐血下溲血咳嗽聲啞

八十七

灰嫂汪氏患痢者余喻以灰涎粒去之即愈
月

邵采儀夫令春咳喘不止桃木燭之即愈

程玄祖兄春經合時腹痛即屏

汪郎兄患痛

查昇川氣虛腹痛

程王吾內人患之

一黃氏婦受白濁

吳見鞠令煎此藥服之即愈
一八歲出痘

新編醫方

侄女八歲腹高膨脹甚則嘔血

從月經年五旬右腰痞手及膝痛不能步履

小童上達腹虛每時

族侄良珍血痢腹痛

一婦經年白痢大便波瀾

從弟婦程氏右脇痛不能睡背心坎熱痛作梗

中有血

黃懷慶原患吐血又咳嗽

一族弟年七十咳嗽

婦戴氏心痛徹背背痛徹心一發必七日 百五

一僕來興痰火上壅胸脇背心脹痛 百六

一婦生女不生子多思多鬱小便秘而不通轉肘

症也 治奇
百七

昆池太學內人牙痛一晚暈厥三次 百八

一僕婦產難子宮墜出戶外半月不收 治奇
百九

侄孫媳程氏體肥經閉者八年 百十

熊成八官早起行路眼見邪火二團滾來大被驚

駭 百十一

醫案四卷

明新女生生子孫一奎文垣甫輯

門人

余煌
徐景奇

子

泰來
朋來

全閱梓

新報治驗

孫文舉子元素多瘡疥近因沐浴鼻涕出紅面足
浮腫汗多左脉大而有力右寸亦大據脉多思

而氣不暢以舊根大腹皮厚朴赤茯苓黃連

酒洗不絕食氣腹不通可下斤冷水煎飲之

一服之效如神

一服之效如神

一服之效如神

一服之效如神

一服之效如神

一服之效如神

一服之效如神

一服之效如神

陰之經挾鬱之而痛恐成腸胃之患
一帖半夜後痛即減半汗亦尋止次日
脉稍退小腹堅如石按之且痛自與前
環跳穴亦作痛直至於膝小腹漸軟小
便亦未通利仍與前藥每帖用大黃二
錢加牡丹皮莪朮五靈脂金銀朮服下
大便秘利
熱退痛止小水亦長諸症悉平二

太學恒宇姪令堂仲有右肩筋搐腫痛夜尤甚次
日痛連胛下出膈入曲池且洒淅寒熱以二陳

湯加南星酒茶白姜蚕羌活秦艽歲靈樛服後
至子丑時痛乃減半而筋不搐矣紅腫畧消次
日減去南星加當歸川芎其夜肩痛又逝減半
一夜不睡口乾舌硬用川芎當歸防風秦艽甘
草歲靈仙白姜蚕酒茶白芍藥服此熱全退痛
全減飲食始進以人參川芎白芍當歸甘草秦
艽姜蚕防風陳皮調理良

卷三

姪孫君錫頭痛胸膈脹食不消高便吐咳嗽不
住口痰濁如膿大便秘結服此藥右寸洪大以

二陳湯加竹茹滑石石膏酒連麥冬連進四劑
夜與益元丸兼服而嗽吐俱止惟痰濁如膿色
且腥氣觸人此將欲作肺癰改用牡丹皮麥門
冬山梔子甘草貝母枳殼桑白皮紫苑知母當
歸生地黃桔梗四帖全安四

姪孫爾嘉內人三孕而三小產六脉滑數廼氣虛
血熱也由其熱故多滑下因其血頻下心甚恐
怖終日偃卧畧不敢起身稍起血即大下與生
地黃白芍藥白朮地榆桑寄生續斷甘草升麻

椿根白皮黃栢條芩服之而血三日不來惟白帶綿又下過五日後因有不得已事起身稍勞血又大下予謂血滑已久如水行舊路若不澀之必不能止又思血海甚熱亦肝風所致防風子芩丸正與病對宜製與之又製白芍藥六兩側栢葉條芩各三兩防風椿根白皮各二兩蜜丸服之從此血止胎安足月而產一子此後連產三子並無胎漏之患後遇胎漏通用此法莫不良已附告同志以便取用五

瀉。臚。穢。垣。姪。內。人。喉。中。掀。痒。咳。唾。紅。痰。兩。寸。關。洪。
大。內。熱。生。瘡。山。梔。子。小。煎。生。地。牡。丹。皮。滑。石。青。
皮。麥。門。冬。甘。草。黃。連。瓜。蒌。水。煎。飲。之。而。血。止。嗽。
除。後。遇。勞。心。即。咳。嗽。喉。中。血。腥。總。由。上。焦。熱。盛。
而。然。以。枇。杷。葉。山。梔。子。生。地。白。芍。藥。甘。草。牡。丹。
皮。地。動。蜂。天。荅。粉。滑。石。紫。苑。常。服。三。五。劑。兩。月。
而。安。_六

戴。萬。奇。夫。中。痰。後。而。右。手。不。能。伸。動。與。之。牛。胆。南。
星。陳。皮。茯。苓。甘。草。天。麻。姜。蚕。黃。連。木。通。石。菖。蒲。

防已服後手稍能動。惟左邊頭痛。喉舌俱痛。大便秘結。三日一行。又與川芎。荆芥。玄參。桔梗。柴胡。酒。茶。蔓荊子。甘草。杏仁。枳殼。水煎飲之。諸症悉減。但下午體倦。右邊頭微痛。後又為怒氣所觸。舌掉不言。頭復大痛。與連翹。甘草。山梔子。薄荷。石菖蒲。遠志。木通。麥門冬。五味子。白芍藥。黃柏。調理而愈。^十

亮卿文學內人頭痛。遍身痛。前後心。兩乳皆脹。土戶撮急。肛門逼迫。大便三日未行。口乾。因大拂

意事而起。下午發熱。伴瘧。惡心煩躁不寧。而時
當盛暑。廼怒氣傷肝。挾暑熱而然。以石膏三錢。
青皮。柴胡。枳殼。各一錢。半夏。麴黃芩。各八分。甘
草。桔梗。各五分。夜與當歸。龍會丸下之。大小便
皆利。熱退而諸症悉減。惟畧惡心。與青脾飲兩
帖全安。八

梓林兄令眷。右手痛風。小水頻迫。起身稍遲。即出
不禁。足有浮氣。年過六十。右寸關脉濡弱。左手
和此脾虛停濕之症。近且咳嗽。用六君子湯加

蒼朮石菖蒲遠志大附子晚蚕沙倍加薏以仁
緩治而平九

一婦經不行者三月大便瀉腹脹嘈雜吐酸水時
下白帶常惡心自以為有孕予脉之候非有孕
廼脾經有濕熱心經有瘀血症也與二陳湯加
白朮澤瀉猪苓酒連木通吳茱萸滑石麦芽山
查瀉止腹寬經行腰腹作痛以川芎三錢常歸
五錢香附丹參菴仁各一錢水煎服之經雖行
口中吐出黑血水甚多且面有紅暈者改用四

物湯加牡丹皮丹參桃仁紅苓山梔滑石調理
西月而痊十

姪婦程氏。下午喉痛。近來痰多。暈厥。一日二三發。
頭痛面赤。素未生育。左脉絃大。右寸關滑大有
力。以荊芥薄荷甘草桔梗玄參姜蚕柴胡枳壳
竹茹貝母水煎飲之。連進二帖。其夜得睡。惟背
脹怔忡。痰猶不清。面多熱。用黃芩枳壳甘草桑
白皮地骨皮天苓粉玄參前胡半夏麴橘紅山
梔仁調養而平。十一

江銀兄時疫熱病被發汗過度熱留胸中煩燥不止嘔惡不安汗竟不斂口且渴脉之獨西關洪大此陽明之熱尚在當以白虎生脉湯為主石膏五錢知母三錢人參白芍藥甘草石斛各一錢麥門冬二錢五味子十五粒急煎飲之而熱退繼以益元丸服之而吐亦安十二

何明吾時疫食復太便不通嘔惡內熱昏憤不省人事或作夢語循衣摸床此熱在心包絡經以竹茹麥冬知母山慈姑一錢陳皮半夏麴酸東

枳實各八分。甘草三分。服之。至夜半人事稍
清。餘熱未散。用石膏三錢。知母二錢。竹茹。麥門
冬。生酸。寒仁各一錢。天。芩。粉。陳。皮各七分。枳實
麥芽。半夏。麴各六分。水煎飲之。下午大。便。行。而
熱退。諸症悉愈。十三

疾。症。元。素。春。溫。頭。痛。發。熱。左。脉。絃。大。右。洪。大。以。小
柴。胡。合。白。虎。湯。二。帖。而。愈。廼。為。食。復。發。斑。色。紫
神。昏。人。事。不。省。身。重。不。能。轉。動。即。水。火。皆。不。自
知。合。目。針。睡。形。如。醉。人。面。赤。發。熱。舌。胎。外。黃。內

黑膏有芒刺。三日後予至脉之六部俱浮洪。以
三黃石膏湯加枳實鰲甲進之。稍得微汗。大便
如有真糞。次日絕。開目言語。乃進粥一盞。改以
小柴胡湯加山梔枳實鰲甲。白芍藥調理而愈。
十四

僕子孫安室晨出門。途次食麵三椀。飢勞感疾。因
麵內傷寒。裏皆熱。及至績溪街中。昏悶譫語。頭
痛身疼。腹痛醫不奏。蒸勞倦感疾。遽以遇仙丹
下之。大便瀉三四次。下而為挾熱下。

初之候急歸視之。舌沉香色。額疼口乾燥。鼻頰
悶昏。又憤。又脉左絃數。右洪數。但不克指知為
誤下壞症。以柴胡石膏各三錢。白芍藥黃芩竹
茹葛根各一錢。天荅粉甘草各五分。山梔子枳
實各七分。葱白五莖。水煎服之。後半夜吐蛇一
條。乃稍得睡。次早大便猶瀉二次。嘔吐酸水。腹
仍痛。改用小柴胡加滑石竹茹。夜熱甚。與綵瓜
汁一碗。飲既神頓清爽。少頃藥力過時。煩熱如
前。再以綵瓜汁一大碗進之。即大發戰。予謂此

戰非寒戰乃作汗之微耳。不移時汗果出而熱
猶然。憶活人書云。再三汗下熱不退。以人參白
虎湯加蒼朮一錢如神。迹此再加玄參升麻柴
胡白芍藥黃連。飲後身上之斑先發者紫。後發
者紅。中夜後乃得睡而熱散。斑尋退去。腹中微
寒。腸鳴口渴。右脉尚滑。左脉已和。再與竹葉石
膏湯加白芍藥蒼朮。服後睡安。腹仍微痛。用柴
胡芍藥各一錢。人參酒苓陳皮半夏各六分。甘
草三分。烏梅一枚。服此腹痛漸減。精神復長。

之惟而膝痛不能轉動此大病後汗多而筋失
養之故宜當補益人參黃芪白芍藥桑寄生枸
杞子薏以仁桂心牛膝熟地黃水煎服後加木
瓜黃栢當歸減去桂心調養而痊十五

一人喉疼夜卧氣壅不能伏枕痰嗽不出遍身生
瘡面足皆浮夜間發熱睡醒多出冷汗此由脾
經有濕熱水氣不利而然薏以仁款冬苓陳皮
貝母前胡蘿蔔子桔梗桑白皮茯苓甘草服此
喘嗽大定乃得伏枕惟下體腫脹不消且膚皮

紫硬小水黃。動作則頭眩。用大腹皮、茯苓、皮、陳
皮、桑白皮、五加皮、生姜、皮、木瓜、姜黃四劑而消。
十六

善易數者何洗心。每飲食稍冷。饘粥或稀。必作脹。
瀉理脾之劑。歷試不瘳。就予脘之左三部皆濡。
弱。右寸亦然。關滑尺沉。微此下元虛寒。而致法。
當溫補以補骨脂、杜仲、兔絲子各二錢。山茱萸
肉、人參、山藥各一錢。白茯苓、澤瀉各八分。肉果
五分。數劑而愈。十七

湘孺人孫氏。鼻衄後眩暈。嘔吐清水。夜卧不安。腹中飢而食不下。由脾虛肝膽有鬱火也。以人參黃連白朮扁豆甘草陳皮半夏竹茹茯苓石膏水煎調養而平。十八

姪君孝。後溪兄次子也。三月患頭項痛。腰脊強。遍身如被杖。臍腹亦痛。口渴不寐。飲食不進。六脉浮數。吳醫以為陰虛。為滋陰降火。三投而三劇。反加嘔惡。又與疎通熱尤不退。下午煩亂。延方和宇大視之。以為外感。擬進人參敗毒散。吳爭

之。謂陰虛體弱。難再汗。仍用四物湯加柴胡葛
根。薄荷黃芩知母而熱如焚。神且昏冒矣。予時
遠出。促歸。診之。六脉浮絃而數。鼓指。語之曰。此
春溫症也。方。胗良。是因復加內傷。以故病劇。滋
陰之劑。壅而作滯。且引邪入於陰分。宜乎熱加
而躁悶也。法當清解。無消可愈。無傷以一陳湯
加羌活柴胡。防風。麦芽。山查。服下得微汗。熱退
其半。惟下午作潮。大便未行。腰膈之痛不止。用
小柴胡湯加葛根。白芍藥。青皮。黃連。山查。飲下

熱又少退大便已行腰臍之痛亦隨減去但不
知餓再以柴胡甘草青皮枳實麥芽知母黃芩
白芍藥諸症悉平惟覺體倦乏力加人參白扁
豆薏以仁減去柴胡青皮調養而痊十九

一僕婦頭疼喉嚨痛咳嗽嘔惡吐痰胸膈作脹經
水適來身熱口乾此少陽經痰火症也用柴胡
為君半夏白芍藥竹茹為臣葛根天竺粉橘紅
桑白皮黃芩知母為佐甘草桔梗為使一帖微
汗而熱散痛除惟痰嗽不轉小水短濇柴胡知

母竹茹麥冬各八分白芍藥一錢滑石三錢黃
芩貝母桔梗各七分五味子十二粒甘草三分
一帖而瘰二十

族侄婦范氏大叅晞老女也素有痰涎胸腹痞脹
近因乳腫大發寒熱欲成瘰毒以加味神効瓜
萸散二帖寒熱雖退而腫不消用貝母白芷為
臣瓜萸為君赤芍藥當歸連翹為佐青皮甘草
柴胡為使痛雖減而腫仍不消脉之近數知已
成膿乃與內托十宣散加金銀花蒲公英兩帖

而膿潰因脚上生瘡而有浮氣前方去蒲公英
金銀朮加薏以仁蒼耳子調理全安二十一

表姪女黃氏孕已七月患赤痢腹痛後重體素弱
舉家甚憂以白芍藥三錢條芩一錢伍分白朮
地榆各八分甘草三分二帖而愈後五日報云
因積勞痢又復來數以當歸三錢川芎一錢半
真阿膠二錢艾葉三分一帖全瘳二十二
一程氏婦吾孫門女也小產後二十日矣患赤痢
一日十餘次怯寒惡食小腹脹痛脰之右寸滑

大知其虛中有熱。憶其惡露未盡。故小腹脹痛。專科泥丹溪產後大補氣血之語。緊施之。因而作痢。乃翁曰。病尚怯寒。何云有熱。予曰。書云。惡寒非寒。明是熱症。由熱極而似水也。飲藥後當自知之。以白芍藥當歸滑石為君。桃仁酒芩酒連為臣。木香桂皮檳榔為佐。青皮為使。服下果去臭黑瘀血甚多。小腹頓寬。惟口乾。小水必惡。心怕飲食。體倦。仍重。急後重。人參川芎白芍藥各一錢。歸一錢。五分清酒連陳皮各六分。木香

二分。外與清六丸服下。熱除痢減十之八矣。但
大便不實。惡心虛弱。以四君子湯加酒炒白芍
藥。陳皮木香。肉果酒連當歸。養之而平。二十三
孫竹塹。浙歸途次受暑。又為酒麪所傷。因而作吐。
胸膈痞悶。時師以消導之劑。燥動脾火。口渴嘈
雜。躁亂不寧。目珠如金。一身盡黃。已成疸症。診
獨右寸脉滑大有力。先以溫胆湯倍加香薷。滑
石。葛根。解暑止吐。為君。黃連。麥門冬。清熱止渴。
為臣。使濕熱散而黃自瘳也。連與三帖。吐止食

進黃亦定矣。再與五苓散加青蒿葛根滑石黃
連枳實八劑而黃釋然。

十四

程菊泉暑月患喘嗽。咳連聲。濃痰滾滾。行動則
喘促不寧。夜分口渴。胸膈脹悶。兩寸脉滑而數。
兩關絃。此肺有宿痰。膽有鬱火。內經云。火鬱發
之。又云。風寒外束者。可發。用紫蘊子半夏麝香
仁各一錢。石膏二錢。款冬。桑白皮各八分。桔
梗。枳殼各五分。麻黃三分。服下無進退。改以杏
仁。陳皮。人參。貝母。款冬。蒼麥。門冬各七分。薏以

仁一錢五分。栝梗知母各五分。五味子十一粒。
桑白皮一錢。陳皮六分。服下痰減大半。胸膈仍
不舒。口仍乾。脚仍熱。前方減去款冬。荈五味子。
加枳壳。葶藶子。兩帖全安。二十五

程應禎兄。胸膈背心時常脹疼。頭眩暈。脚軟弱。手
指痛。咳吐紅痰。脰其脉左關絃大。右寸關滑太。
予謂此食飽後感於怒。老痰瘀血積在上焦。宜
其胸背脹疼。而熱壅也。治當清化上焦。使新痰
不生。宿痰磨去。則萬全矣。如落時套。用地黃山。

茱萸等滋陰降火之劑。是以滯益滯。則熱無由去。痰無由消。而痰益增。不去也。病者聞言。謬然曰。未見公時。業已服過一月久矣。疑其飲食。燥而熱。尋加胸背痛。脹逆長哉。予曰。今反轍。幸早耳。再遲。則敗事。亟以青皮。枳殼。陳皮。快其氣。而疎其壅滯。蓋痰隨氣行也。貝母。桑白皮。以消餘痰。而清其嗽。牡丹皮。滑石。桃仁。消其瘀血。山梔。仁。開鬱。清熱。白芍藥。伐肝。補脾。甘草。調和諸性。緩而理之。當見其去。泰去甚也。別後半月。復書。

報云胸背之脹減三之二。血已十日止矣。痰如
舊。改以山梔仁牡丹皮丹參赤芍藥桃仁各八
分。滑石三錢五靈脂當歸尾各一錢半。夏麴青
皮各六分。諸症悉去。獨足心熱。再以黃柏知母
以仁牛膝甘草白芍藥茯苓陳皮貝母石斛牡
丹皮調之如初。二十六

虛山內人胸脇脹痛。五更嘈雜。每一嘈雜則痛發
更甚。左寸關脉洪滑。右關亦然。此肝胆有鬱。太
胃中有膠痰。廼有餘之疾。內經云木鬱則達之。

蓋木火之性貴乎疎通當以龍會丸條而達之
顧痛則不通通之則不痛也服龍會丸一錢五
分大便行一次痛隨殄迹惟穀不開以陳皮紫
胡貝母茯苓甘草白芍藥酒苓香附杏仁桔梗
調之而安二十七

婦當暑月小便不利而痛玉戶腫且又便血發
熱左脉絃數右寸短弱此肺氣不足肝火太熾
蓋肝為血海肝又主小便玉戶為肝經所絡之
地治當疎決肝經壅塞俾氣暢則新血得以歸

經熱解則小水可不痛而腫亦可消矣以滑石
三錢桃仁當歸白芍藥各一錢柴胡黃連人參
各八分川芎六分甘草桂皮白芷各三分四劑
而病如失

二十八

族弟婦戴氏腹中痛在臍腹白帶如注四肢痠
疼大便裏急後重已成赤白痢矣脉之兩寸關
俱滑數尺亦數以白芍藥當歸黃連黃芩木香
枳即桂皮甘草滑石桃仁桔梗一劑而紅止惟
小水短澀下午發熱大便一日夜仍四行改用

白芍藥當歸白朮陳皮滑石甘草茯苓厚朴酒
連酒芩桔梗柴胡木香飲下諸症悉愈惟頭痛
腰疼再以桂心當歸白芍藥白朮茯苓甘草酒
芩酒連破故紙木通黃柏煎服全安二十九

族弟應章胃脘當心而痛手不可近疑有瘀血使
然玄胡五靈脂牡丹皮滑石川芎當歸甘草桃
仁桔梗香附水煎臨服加韭菜汁一小酒杯其
夜痛止得睡飲食亦進惟大便下墜逼迫不安
此瘀血已動欲下行也前劑減去韭菜汁一帖

全安 三十

予弟淑南額痛遍身疼口乾舌胎黃面左脉浮太
六部俱數時當仲秋初旬以小柴胡合白虎湯
加羌活熱仍不退下午用六神通解散以葱湯
調服三錢熱稍退至半夜後又復熱額疼頂巔
尤甚舌根黃且焦黑小水赤痛煩躁不睡遍身
又痛此三陽合病暑症也次日以小柴胡大加
石膏為君葉本白芷竹葉粳米生姜大棗少頃
汗大出至足熱始盡退猶煩躁不睡仍以小柴

胡湯加桂枝山梔子竹茹竹葉飲下煩躁寧而得睡餘熱悉平精神爽而向安矣。三十一

一富家婦當仲秋大小便秘者三日市師以芭豆丸二帖大便秘而小便愈秘脹悶臍突二寸餘前陰脹裂不能坐卧啼泣呻吟欲求自盡此轉臍病也。和樹東行根皮一寸滑石二錢玄胡索桃仁當歸蘖麥各一錢水煎臨服入韭菜汁半杯服後食頃而小便稍行玉戶痛甚小便漸通用力努之則不能出改用升麻桔梗枳殼玄胡

索煎成調玄明粉二錢乃提清降濁之意服後
大小便俱行始不脹急次日報云每大小便來
時腹中先痛有淡血水小便短再以丹參升皮
當歸白芍藥甘草青皮香附玄胡茯苓山梔子
山查兩帖各症良安 三十一

孫文約孺人年八十有三胃脘疼痛手不可近腹
中飢而飲食不能下兩寸關脉滑大兩尺沉弱
此血虛氣滯症也先與積氣丸一服而痛減半
再用生白芍藥山梔子五靈脂各一錢酒炒白

芍藥二錢粉草山查香附各八分一帖全安
十三

應章族弟三陰瘡發於子午卯酉日已四越月
每發於夜熱多寒少左脉微絃右關滑大以二
陳湯加柴胡黃柏川芎當歸黃連兩帖而熱稍
輕飲食不進四肢懶倦脾氣大虛白朮何首烏
各三錢鱉甲二錢青皮七分烏梅一個一帖而
截三十四

太學程好吾個儻博洽士也季春患兩太陽痛胸

脇稍疼。口渴大便水瀉。左脉浮弦而數。中按有力。右關滑大。予曰。春溫症也。柴胡。前胡。葛根。粉草。青皮。黃芩。知母。桔梗。半夏。麴石膏。半夜後得微汗。因起大便。感風續又發熱。依然口渴。更覺煩躁。石膏三錢。知母。柴胡。各二錢。葛根。黃芩。各一錢。粉草。桔梗。各五分。竹葉二十片。西進而出熱解。諸症悉平。四肢尚倦。口微乾。語言乏力。以生脉湯加薏以仁。石斛。甘草。白芍。藥黃芩。調養如初。三十一

令媳長卿之婦。腹中微疼。經行不流利。喉痛。四肢麻木。作戰。不知飢餓。右脉洪大。如菀豆。以川芎香附。麦芽。山查。烏梅。粉草。桔梗。酒苓。防風。荆芥。白朮。茯苓。四劑而安。次月經水大行。以黃耆。阿膠。蒲黃。各一錢。白芍藥。二錢。粉草。三分。一帖而止。此後但覺濁氣下墜。屁從子戶中出。以補中益氣湯加酒炒黃連調養而平。三十
六

子應章之弟。

至次年仲春未止。

每發於辰戌丑未日。午後寒多。熱少。夜有盜汗。
左脉軟弱。右關尺絃數有力。用白芍藥當歸各
一錢。白朮二錢。柴胡川芎粉草砂仁桂枝酒苓
各三分。生姜三片。水煎服。再以前首烏白朮
甲各三錢。柴胡一錢。青皮酒苓甘草各五分。烏
梅一個。生姜三片。水煎。臨發日五更服之。兩帖
而止。後半月下身大生瘡癰。以東坡四神丹調
理而痊。三十七

油潭吳中岳孺人。先感風邪。後傷飲食。發熱頭疼。

腹中作脹。醫與苳豆丸瀉之。而熱不減。後醫又以大黃重瀉之。而熱亦如初。再後醫謂瀉而熱不退者為虛。大用參耆白朮補之。補經四日。神氣昏沉。不知人事。乃敦予胗左脉絛數。右關尺沉數有力。舌尖沉香色。舌根焦黑芒刺。語言含舌不清。扣前服藥始知妄下妄補。不思飢饉之餘。痰氣為厲。誤成壞症。危而且殆。姑以知母。紫胡各五錢。石膏六錢。枳實天荅粉各五分。粉萸黃芩麥冬各一錢。山梔子生地黃各七分。人參

六分竹葉三十片生薑三片水煎飲之中夜後
人事稍清微有汗舌稍柔和語言已不啞舌驢
駸然有生氣矣次日前方減去地黃加白芍藥
舌心焦黑盡退諸症十減其七但大便五日未
行遍身尚痛咳嗽與七製化痰丸二帖再以石
膏二錢麥冬貝母各一錢前胡枳實黃芩梔子
各六分甘草三分桑白皮八分煎服而安三十
八

鮑子五保時疫耳聾體有熱口乾大便五日不行

人事不清竹葉黃芩柴胡半夏麴甘草枳壳天
荳粉知母煎服而熱渴更甚大便秘行而瀉手攣
縮不能伸且發呃或又咳嗽改以柴胡石膏竹
茹人參甘草麥冬半夏麴橘紅黃芩黃連一帖
而呃止瀉除諸症悉罷而安睡矣三十九

侯子孫守以中麻咳嗽無痰上唇厚腫體熱大便
燥聲啞以麥門冬知母瓜蒌仁甘草白芍藥桑
白皮地骨皮石斛枳壳五味子服後嗽減其七
廼減去瓜蒌枳壳以其大便已溏加生地黃當

歸薏以仁調理而安。四十

僕子得貴。春溫頭痛。體熱面赤。舌心焦燥。以石膏
柴胡葛根甘草黃芩知母天荳粉白芍藥服之。
而舌不焦黑矣。進粥太早。半夜後又復發熱。中
脘硬痛。與大柴胡湯一帖。汗出津津。大便秘行二
次。腹痛不止。乃以小承氣湯調下玄明粉一錢。
大便又行二次。熱不退。而痛全減。旋作鼻衄。改
以石膏牡丹皮生地黃山梔子甘草升麻黃芩
赤芍藥一帖。而熱散衄止。四十一

元素姪令政春溫後經水適止餘熱不退口中甚渴胸脇痛而耳重脉左絃數右滑大而數小柴胡加石膏知母桔梗枳壳葛根瓜蒌半夏麴服下而熱渴如舊改用柴胡二錢人參甘草天花粉黃芩各七分白芍藥紅苓當歸牡丹皮知母各八分調理而瘳四十二

朱氏子天送時疾頭疼身若燔炭口渴氣促申酉刻熱潮更甚舌心焦黑遍體紫斑語言含舌不清時多發呃耳聾先治前症連服香正氣散而

加嘔逆水瀉。又醫以柴胡湯嘔益甚。熱轉增劇。迎予為診。六脉俱洪數。此少陽陽明合病之疾。以石膏五錢。知母柴胡各三錢。黃芩一錢五分。半夏麴麥門冬竹茹橘紅葛根各一錢。粉草枳實各五分。服下熱退。其舌不燥矣。再以柴胡半夏麴白芍藥竹茹各一錢。石膏三錢。麥門冬知母一錢五分。黃連甘草人參各五分。水煎飲之。而斑退。諸症悉平。四十三

朱桃源內人。胃脘疼年五十有二。經水尚行不止。

一月且二至。每至十餘日不淨。白帶淫淫下。常
苦夢遺。近又眩運。先與補氣丸一帖。以止胃脘
之痛。再以逍遙散加石蓮子。蓮心五倍子。煉
蜜為丸。每早晚白湯送下二錢。夢遺竟絕。

四

桂亭兄。壯年原有濕熱痰積。年逾艾偶墜轎。跌傷
背脇。專科以草藥敷貼於外。內以藥酒攻之。而
愈。越十五年。左脇痛手不可近。左脉絃數。堅勁
搏指。小腹亦痛。知為癰痰及痰積作祟。以青皮

赤芍藥黃連當歸尾各一錢桃仁一錢五分大
黃二錢滑石三錢水煎服玄明粉一錢
下吐出痰涎枳實大便秘結
赤芍痛及腰不
行而未能也再與大黃當歸尾紅芍牡丹皮
芍藥各一錢桃仁二錢滑石三錢青皮八分
玄明粉一錢再下之大便行三次皆沉香色
粘痰物腹痛雖除跨痛仍在用乳香沒藥歸尾
紅芍各一錢桃仁滑石各三錢大黃二錢川山

甲丹參各一錢五分。服後大便行四次。所下皆
紫黑如筋膜者。不可勝計。諸病悉減。因食鷄湯
牛肉。臍腹又痛。裏急後重。此餘積未盡。欲再下
之。舉家驚怖。謂六旬已外之年。已下數次。恐脾
弱不能再下。予曰。醫貴認病。何以年齒數下拘
哉。今藥力到而積已動。夫破竹之勢。可迎刃而
解。若失時姑息。恐它日必夢欲下難動也。行後
而補庶無反顧之憂。大元然之。以紅卷桃仁當
歸尾赤芍藥山梔仁玄明索牡丹皮川山甲滑

石煎調玄明粉下二次。紫黑瘀物如前之半。腿
跨小腹痛則俱釋。次日用人參茯苓白芍藥粉
草陳皮山查桂心當歸半夏調養半月。精神步
履飲食一如舊矣。四十五

江右熊二官。疫後食復額痛口渴。譫語神昏面青
舌黑。鼻中傳灰。不省人事。小水短少。勢已危急。
以小散胡湯減去半夏。加石膏知母當歸山梔
子豆豉枳實。急與服之。一飲便得微汗。熱退大
半。次日以紫胡滑石甘草知母石膏人參桔梗

黃芩天荅粉與之。舌黑始退。人事乃清。飲食繼進。霍然生矣。四十六

堂弟東里內子咳嗽吐紅。發熱頭眩。脚膝乏力。先已服滋陰降火十數劑。不愈。飲食漸少。精神漸羸。懇予治之。兩寸脉藹。又如貫珠。兩尺俱軟弱。此上盛下虛之候。上盛者痰與瘀血也。下虛者腎陰弱也。且生平好飲。不無助熱。法當先清上焦。化去瘀血宿痰。然後以養陰藥收功。則病根可刈。癆瘵可免也。用貝母。知母。桑白皮。清肺化

痰滑石桃仁牡丹皮小蘇消除瘀血山梔子其
草白芍藥養血以祛餘熱三帖後紅漸稀少前
後心始不脹痛惟痰嗽不止大便結燥減去滑
石桃仁加瓜蒌黃芩紫苑調養而平四十七

由溪程竹坡孺人年過六十為疫所染頭疼口渴
舌胎前黃燥後紫黑身熱沉重人事昏憤語言
錯亂小水短澀嘔逆煩躁合目不開諺語不輒
口耳聾胸脇痛時五月初旬也迎予為診左浮
而絰數右洪長而數胗畢仲君清夷問曰何症

予曰此熱病類也。清夷曰因體熱便名熱病乎。
予曰否否。仲景謂春溫過時為熱病。矧茲又為
熱癘也。邪在陽明。少陽二經。又問曰可生乎。予
曰脉症對可生也。此症遠邇染延甚夥。不足恠。
清夷曰適方和字亦云少陽陽明二經之病。二
公所見既同。乞確一方為幸。予與和字診多
符合。即以柴胡石膏為君。知母。麥門。冬。天。花粉。
竹茹為臣。黃連為佐。甘草。枳殼。桔梗為使。連進
帖。丑刻微汗。熱退神清。不虞即進葷粥。下午

又復大熱。譫語昏沉。舉家驚怖。予曰。此發候也。即以小柴胡湯加山梔子枳實黃芩豉。煎甲四劑。復得汗。熱從散去。神頓清爽。仍口渴煩躁。以生脉湯加黃連香薷竹茹竹葉而安。四十八

程家內眷。藏溪汪氏女也。乃夫歿於疫癘。新寡七日。疫即及之。大熱頭疼口渴。胸脇併痛。醫與小柴胡湯。夜忽夢夫交淺而覺。冷汗淫淫。四肢如解。畧不能動。神昏譫語。面如土色。舌若焦煤。強硬。遂予診之。六脉沉絃而數。大小便俱秘。此亦

陰陽易類也。復後有是危已極矣。予以生脉湯加柴胡黃芩桂枝甘草水煎成。將乃夫昔穿舊袴襦燒灰調下。兩劑而神醒體溫汗歛。舌始柔和。焦亦漸退。次日仍以前方加酸棗仁竹茹。四肢始能運動。乃飲粥湯。僅一子甫十歲一女甫十四。繼被疫困。均以六神通解散汗之而安。妯娌及婢輩六人皆六神通解散瘳之。舉家德予以為再造。再造。四十九

姪太學從明夏初由客邸患滯下。調半痊而歸。

因食隔宿猪首而復裏急後重晝夜三四十度
日漸沉困口渴胸膈焦辣手心熱腹微痛小水
少每解時先乾噦嘔惡汗出飛飛下皆稠粘紫
黑血無糞彼素知醫且慎重不輕服人藥故予
胗之脉左沉絃右滑數面色外黑內黃飲食不
入肛門辣疼予以渠原稟薄弱今遠歸途次不
能無勞不敢踈下姑以胃風湯加黃連與二帖
不効腹稍加脹渠叮予曰古云無積不成痢顧
積勢膠固切勿用補無以體素弱為疑予曰諾

改用黃芩芍藥湯三劑無進退。廼私語渠姪元亮曰。令伯之症實實虛虛熱熱寒寒。寔不易治。且穀食禁口不入。乾噦可慮。須得明哲參治。元亮從容言之。欲得方古。堪為翼。諸相契及。內養。廼相讚言。太學不從曰。吾豈不重命而吝費哉。顧新都之醫。無如叔最明。吾之交。無如叔最厚。舍叔安所倚。元亮曰。叔祖善矣。能用人之長。得一雋商確。可無後慮。太學怫然曰。知莫貴於知心。吾知其心久矣。專任勿疑也。予知渠信任堅。

若金石。益加研究。圖欲先開胃口。使新穀食將
宿穢壓出。或補或攻。視緩急以為方畧。迺背囑
元亮曰。令伯非人參不可。幸且勿靈。俾予得以
盡技。元亮曰。諾。迺倣朱丹溪法。用人參黃連各
二錢煎濃。細細呷之。但得一呷下咽。胃口便開。
噦惡便止。蓋胃口虛熱。衝上為噦也。其日用之。
噦惡即止大半。連與西日。覺胸腹脹。即以保和
丸應之。覺小水不利。又以清六九應之。裏急後
重。以參朮加苓連木香枳。即滑石桃仁應之。人

參皆背加。太學不知也。渠每診必叮予曰。日來
疾稍平。叔之力也。幸勿遽補。恐廢前功。予曰。如
教。詎知人參已服過十日。計二兩許矣。此後脉
僅四至。軟而無力。憶丹溪云。虛臥而痢自止。又
云。氣虛甚者。非附子不能行。參耆。迺以胃風湯
加黃耆。附子。姜炭。四劑而血全無。後重亦止。惟
大便瀉而不實。所下俱黃糞。渠知積滯已盡。始
欲理脾。用參苓白朮散服十日。便仍不實。迺問
予曰。補脾而瀉不止。柰何。予曰。據脉迺下元虛。

寒。殆腎洩。非肥洩也。溫補下元。則固矣。蓋腎者
胃之關。初不敢用下劑者。慮有今日也。故以鬼
絲子破故紙杜仲山茱萸人參大附子白茯苓
澤瀉四帖全瘳。里中稱太學能知人。而予不負
所任也。五十

查少川公。年四十三。夙有哮喘疾。每發則遍身如
燄。氣賁賁上騰。息息短促。喉中痰聲。响若湯沸。
經七晝夜。汗而漸平。居常嗜飲。通宵不輟。醉後
縱慾。不避風寒。族中有教以石膏麻黃杏仁枳

賣細茶各一兩作大劑飲之名曰五虎湯喘至
即以此禦之隨飲而止屢發屢進應若桴鼓公
喜甚特為保命丹寓大通一月邑中麻黃石膏
為之缺市詎知情慾無窮胃中沖和有限三年
之間飲五虎者殆不可以數計而胃中之沖和
者亦不知損之何若也因而腹大若覆箕兩腿
光腫如柱內外癰疥瘡中清水涓涓流之不竭
晝夜腥氣逼人不能伏枕而臥者五越月自儀
楊醫起聞京口之醫如何如獲者最良邇延治

之彌月。卒無一驗。又公景口抵姑蘓。歷嘉杭。凡有名者悉迎療之。而勢益劇。昇四至岩鎮。鎮醫擅名者吳與方也。先詣吳。吳駭辭不治。就方。方胗視久之曰。公疾非常。必得非常人。廼可已。公曰。先生世家大方。昔在兩淮。且人人引領。願得先生一胗。為快。何我棄而使需非常人也。今世非常人。舍先生其誰。方曰。嘻。公貴邑孫生生者。名動三吳。今歸不出。亟迎治之。或可無恙。公扣孫生生居何里。狀何若。方書予姓氏。里居與之。

歸即懇程公山氏紹介。迺予時長至後一日也。至則見公坐高椅之上。氣高而喘。身熱而煩。覆以綿被。足納火箱。前後左右環火五盆。首戴絨帽。帽外籠以貂套。套外仍束一帕。鼻用絨套籠之。明設重幔。猶凜凜怯寒。胗其脉浮大無力。睇其色白中隱青。徐問公曰。惡寒身熱。從何時起。公曰。十日。予曰。據色推脉。予已得其概矣。公歷數府名家。認為何症。推何湯劑。請詳述之。公曰。衆論落落不一。先生處守博見真。願惟命。予曰。公

疾。迺氣虛中。滿。法。溫。補。下。元。人。徒。知。利。小。水。
不。知。小。水。不。利。者。由。下。焦。之。氣。不。充。不。能。滲。從。
膀。胱。故。道。而。行。若。利。之。急。則。汎。濫。而。橫。流。肌。膚。
下。於。陰。囊。甚。則。脹。裂。崩。漏。而。出。若。使。下。焦。壯。盛。
則。小。水。自。通。譬。之。甑。炊。釜。底。水。火。交。旺。甑。中。之。
氣。自。然。蒸。騰。若。霧。若。露。內。經。曰。上。焦。開。發。宣。五。
穀。味。薰。身。充。膚。澤。毛。若。霧。露。之。灌。漑。是。謂。氣。故。
曰。上。焦。如。霧。也。清。陽。升。則。濁。陰。降。降。下。則。為。小。
水。故。曰。下。焦。如。瀆。也。瀆。者。水。也。言。下。焦。為。決。水。

之官。水道出焉者是也。人之汗即此霧露之氣。小水即降下之氣。蓋氣者水之母。由氣化而為水。故又曰氣化則能出矣。融衆理而觀之。總由下焦元氣壯盛。斯能升降變化。清陽升。濁陰降。即地天交之泰。陽不升。陰不降。即天地不交之否。否者塞也。此脹滿之所由生也。公之疾起於五虎湯致臟寒生滿病也。公曰善。吾廼今始知致病之源。第近來身熱手熱。而內焦辣。而外惡寒。竟不解。孰為熱。孰為寒也。予曰。仲景云。傷寒

必惡寒。由寒邪在表而然。合先散之。胸膈焦辣者。廼陰盛格陽。虛陽之火。被寒氣驅逼上行。非真熱也。經云。水流濕。火就燥。但得下元一溫。熱自下行。公曰然。唯先生命劑。予以紫蘊馬蹄草炙甘草防風白豆仁蒼朮陳皮人參羌活生薑一帖而得微汗。悉撤去環列之火。僅存足底一盆。首上所覆之巾亦去。獨鼻寒如初。廼用防風黃耆二兩煎湯。直器中。令薰其鼻。飯頃而止。一日凡三薰。次日自寒亦除。嘔惡不止用人參溫

膽湯加丁香進之一帖而止。又謂鯉魚能利水，一日盡二斤，米夜脹極，廼告急於予。予曰：病勢如是，因廼縱恣若此，等閑之劑曷能消釋？沉思久之，以平胃散一兩入橄欖肉一兩，水煎飲之，兩劑而定。獨腹脹，小水不利，不能伏枕，為苦。廼以附子理中湯加砂仁補骨脂赤小豆桂心連進四帖，小水畧長。繼以尊重丸，日三服之。每服五丸。五日後，小水通利，可貼席而睡。守此調理，腹脹漸消。兩月大平。三月而公出市，市中人信。

予寔從公始。五十一

夏益吾肢節腫痛。手足灣痛腫尤甚。不能動止。凡
腫處皆紅熱。先起於左手右足。五日後又傳於
左足右手。此行痺症也。且喘咳氣湧不能睡。左
脉浮數。中按絃。右滑數。兩溼熱風痰壅遏經絡
而然。以茅山蒼朮。姜黃。以仁。威靈。秦。朮。知母。
桑白皮。黃柏。酒。苓。麻黃。水煎服下。而右手腫消
痛減。夜服七製化痰丸而嗽止。迺得睡。再劑而
足灣消其半。左手經渠列缺穴邊腫痛殊甚。用

以仁蒼朮秦艽甘草天荅粉五加皮石斛前胡
枳壳歲靈僊當歸旋服旋愈五十二

初陽姪迺政先時咳嗽諸治無功且嗽急則吐用
碧玉散二錢白朮調下立止後半年復咳嗽胸
背隱隱疼痛身常內熱咳出桃杏膿不可勝計
腥穢之氣甚惡右脇并乳脹痛脉洪數大便燥
肌瘦骨立此肺癰症也用貝母黃根白芍藥各
一錢知母麥門冬山梔子紫苑各八分桑白皮
當歸牡丹皮杏仁各七分意以仁一錢五分其

草薺應各五分。水煎服之。服此甚安。但要常服。若一缺藥。其疾便發。據此肺竅中痰積瘀血尚多。未能即去。宜緩圖之。書云俟膿去盡當自愈也。愚謂丹溪雖有此言。亦不可固執。設不以藥消化之。必俟其膿自盡。恐歲月深而有他變。且中年之人。何能當此。莫若清熱潤肺。消痰化瘀。久而服之。或早愈也。方黃吳諸公謂久咳傷肺。每每投補。屢被紊之。每補必增熱加痛加咳。而膿轉多。予曉之曰。諸公之意誠良。其如病加何。

是姑息之謂也。古人不務姑息。惟以去病為安。夫姑息可以養病。非所以去病也。獨汪無懷然予言。守予法。二年良愈。肌長如初。五十三

族姪仲木內人。賢淑婦也。不育多鬱。腹脹。左脇不能側卧。亦不能仰卧。仰側卧。即氣湧。每午夜背心作脹。氣喘吐痰發熱。必起坐。令人揩摩。久之始定。面有浮氣。右寸關脉滑大有力。此氣鬱食積痰飲症也。蓋憂思傷脾。思則脾氣結。氣結不行。則五穀之津液皆凝聚為痰。故喘急作脹。先

與定喘湯二帖而無進退。繼用核桃肉五錢。杏仁三錢。人參桑白皮各七分。水煎服之。氣喘迺定。惟腹中脹急。改用橘紅半夏麴木香白豈仁。鬱金蘿蔔子姜連香附茯苓四劑。大便痰積隨下。腹脹尋消而愈。五十四

族姪孫女年甫十歲。大便脫肛。鼻中時常出血。夜多咬牙。肚熱面黃。將成疳症。以山查青蒿枳實升麻酒連滑石各一兩。甘草蘆薈乾蟾各五錢。俱為末。神麴糊為丸。一料全愈。五十五

唐岩祈首秋患痢赤白。延至次年春分不愈。腹中作脹。不知餓。每行動則氣喘。四陽之末皆冷。陰囊腫大。便日夜十數行。而肌肉甚瘦。小水短少。飲食減半。面黃。兩跗腫大及踝。與平胃散加酒連猪苓澤瀉升麻防風酒炒白芍藥薏以仁。外與香連九合益元九相兼服。四日而痢止。廼知餓而加食。精神爽快。再四劑。兩跗陰囊之腫皆消。惟咳嗽。用薏以仁酒炒白芍藥粉草澤瀉杏仁桑白皮陳皮姜連茯苓姜黃葛根蘿蔔子二

忙而嗽除。但體乏力。與六君子湯加補骨脂。黃以仁滑石紅麴酒炒。白芍藥桔梗。麦芽調養。半
月而愈。

婦婿程東山。仲夏患休息痢。所下皆紫血。腹痛。盜
清明猶不愈。醫藥備嘗。體倦肌瘦。或三五日一
發。或七八日一發。發必三日廼止。予為診之。左
濡而右滑。據脉有瘀血痰積。近來小水不利。姑
用四君子湯加滑石紅麴。陳皮。山查。澤瀉。升麻。
服後微覺有熱。改以四君子湯加滑石。桃仁。紅

麴酒連神氣稍旺。脾氣始回。廼用耆鴉胆三錢下之。果去紫黑血塊。及如敗魚腸者半桶。從此痛除痢止。次日以六君子湯去半夏加酒炒白芍藥山查紅麴滑石桃仁升麻調之。報云胸膈作脹。恐積滯未盡。而服參朮欲再下之。予為再診。兩寸短弱。兩尺洪大。前日滑濇二脉俱無。此陽虛下陷之候。宜當大升大補。以六君子湯大加黃耆為君。酒炒芍藥為臣。升麻桔梗為使。服此胸膈寬快。精神亦好。雖肛門熱。前方加酒連。

減半夏。脫然平安。五十七

陳氏婦。腸鳴腹痛。大便溏瀉。合目即汗出。下午潮熱。醫謂潮熱盜汗。廼虛怯之症。加之洩瀉。脾氣壞矣。視為不治。洵予診之。右脉濡數。左脉洪數。予曰。此鬱火痰積症也。蓋憂傷肺。思傷脾。飲食因而不化。積而生痰。故腹痛溏瀉。但理中焦。消去痰積。可瘳也。以四君子湯加半夏。麴滑石紅麴。麥芽。以仁酒炒。白芍藥。酒炒。黃連。牡蠣。桔梗。八帖。而病去如釋。五十八

九德姪耳鳴。氣築築然閉而不通。鼻塞不利。口不知味。痰多而鬲熱不清。脉左浮而絃大。右滑大。俱數。內經云。頭痛耳鳴。九竅不利。腸胃之所生也。此由胃中痰火上壅。熱極生風。廼以蔓荊子升麻木通赤茯苓桑白皮麥門冬生地黃前胡甘菊花赤芍藥甘草石膏生薑三片。枣子一枚。水煎飲之。四帖左絃雖減半。而症尚如前。再用甘菊花橘紅半夏麴茯苓甘草知母白芍藥酒芩麻黃石膏桑白皮煅礬如黃耆。又四帖而諸

病悉平。後以六君子加酒連翹。胡川芎白芍。表
門冬升麻。兩帖。飲食亦甘味矣。五十九

陳覺字大常。山縣人也。年四十有三。體肥。患痰火。
十年多矣。每月必一發。或勞心過度。則二發。吐
痰身熱。吼喘。飲食不進。不能倒頭而睡。合目則
乳語。面赤頭痛。遍身痰氣走動。牽扯作痛。必俟
吐出痰後。則耳始不鳴。目始不泪。素服風痰藥。
南星半夏之類。不効。後服參耆。則亦僅止四五
個月。胗其脉。兩寸洪滑。兩尺沉微。殆上盛下虛。

之候法當清上補下以橘紅貝母茯苓甘草桔
梗杏仁前胡鈎藤天麻酒苓枳壳水煎服之夜
進七製化痰丸再以八味丸加人參麥門冬五
味子空心服之半年而瘳六十

程紹溪中羊患鶴膝風症西腿及腳肚內外臃肉
盡削獨兩膝腫大迺酒後縱欲所致經治蘓松
嘉湖杭嚴六府視為痼疾且四肢膿疥連片淫
爛腫膿臭惡難近自分必死家人以渠病入膏
藥破家今則衣食不計無門求食矣

予鄰家偶言及渠病之異家道之窘予聞惻然
鄰素知予不以窘異為憚懇為一看予携仲子
泰來同往令渠沐手診之左寸關浮數右寸短
弱兩尺沉微此氣虛血熱之候法當大補氣血
壯其筋骨猶可冀生病者聞言命家人子媳羅
拜於地請藥予曰病勢已痼非百日不見功蓋
補血無速効日浸月潤漸而濡之關節通利骨
止筋柔腿肉自生初以龜板以仁各三錢蒼耳
子五加皮頭二錢沙節節香各一錢當歸人參

黃耆蒼朮杜仲黃柏各八分紅苓五分水煎服
之十劑而瘡疥漸稀精神稍長再以薏以仁五
加皮龜板各二錢節節香蒼耳子地黃丹參蒼
朮黃柏何首烏各一錢人參當歸各八分紅苓
木通各五分三十帖足可倚杖而行腿肉漸生
瘡疥盡愈膝腫消去其六後以虎潛丸加鹿角
膠何首烏金毛狗脊節節香牛膝用龜板膠為
丸服三越月腿肉復完出之若上若人嘖嘖稱
奇悉錄其方以布

六十一

予堂嫂程氏喉間有物如嚙咯之不出嚙之不可
梗梗不安腹中痛且瀉年五十有八矣迺梅核
氣症也。腹疼痛。迺新疾。以二陳湯加旋覆花白朮
香附熟蘓桂皮厚朴澤瀉。四劑。腹痛仍在。瀉亦
不止。迺用胃苓湯加麦芽砂仁香附。二帖。痛止
瀉瘳。仍用二陳湯加厚朴桂皮熟蘓旋覆花細
辛人參煎服。四帖。而喉中病去如失。六十二
一婦先傷風發熱咳嗽二日。迺分娩。熱尚未退。又
食鷄汁。由等太蚤。咳嗽發熱愈盛。已八日矣。胸

面脹痛。頭痛。口渴。大便秘。咳出之痰色黑而臭。
小水短少。脇下扯痛。氣逆而喘。不得卧。左脇不
能着席。汗出不止。症甚危急。予以瓜蒌五錢。紫
蘊子一錢。枳壳。酒芩各六分。前胡。桔梗各五分。
粉草三分。生薑三片。水煎飲之。胸脇之痛減半。
氣喘稍定。次日再進前藥。大便秘導之熱
盡。退痛盡減。諸症尋愈。六十三

表嫂孀居二十年矣。右癱不能舉動。不出門者三
年。今則神情恍惚。口亂言。常悲泣。詰其故。荅曰。

自亦不知為何故也。診之兩寸脉短。瀉以石菖蒲。遠志。當歸。茯苓。人參。黃耆。白朮。大附子。晚蠶沙。陳皮。粉草。服四帖。精神較好於前。但悲泣如舊。夜更泣。予思仲景大棗小麥湯。正與此對。即與服之。兩帖而瘳。方用大棗十二枚。小麥。合大甘草炙。過三十水煎飲之。此憂傷肺臟。臟寒故多泣也。六十四

桂亭大兄。原因墜轎跌傷。腰脇脹痛。不能轉側。咳嗽弔痛。用三製大黃二錢。桃仁一錢五分。杏仁

紅朮天朮粉各一錢。穿山甲八分。耳草五分水
煎服之。兩帖而大便秘行。繼以五加皮紅朮川芎
當歸生地黃白芍藥丹參甘草桃仁穿山甲柴
胡煎四劑。飲之而痛大定。後因過食葷腥。喘嗽
腰痛。右肩背墜痛。素有濕熱痰積。以葳靈僊紫
蘊子枳實酒苓半夏麴瓜萋仁甘草陳皮姜黃
防風羌活。服後腸鳴。坐則重墜。此痰積已動。欲
行而不可得也。與穿山甲當歸尾紅朮杏仁枳
壳大黃蘿蔔子川芎莪朮青皮。服後大便秘下。

稠積穢瘀甚多。痛隨減去。以保和丸調理而愈。
六十五

堂嫂王氏。兩寸脉洪大。右關滑大。五六月間必吐
紫黑血塊。足跟煖。腫痺痛。時流黃水。與牡丹皮
山梔子玄參甘草白芍藥當歸陳皮滑石桃仁
四劑而愈。六十六

族弟婦程氏。姓已五月。痢下膿血。裏急後重。腰
墜難當。以白芍當歸木香砂仁條芩酒連艾
陳皮煎服。夜仍痛痢三次。次日大便所下如

魚腸者甚多夜半忽兩足脚底前半節紅腫疼痛難安此厥陰肝經虛胎氣下墜也當補氣血以川芎當歸人參白朮紫蘇茯苓甘草枳即服下夜半痛止即得睡矣左脚以人參下

服川芎當歸白朮三錢黃連一錢白芍藥一錢

本續江氏發寒熱調經散小腹痛急後重赤白膿血日下二十餘度口燥咽乾

別本作也以柴胡葛根甘草青蒿枳壳酒苓酒
連當歸白芍桂枝防風羌活川芎水煎服之外
與神授香連丸其夜痢減十之九但遍身尚疼
略惡寒不發熱頭略暈而已改以川芎川歸白
芍木香桂皮陳皮酒連酒苓調理三日全安六

十八

竹閣姪孫赴府考試過食牛麵且勞苦因而發瘰
城中醫瘡半月形神俱瘦瘡愈而腹大如箕矣
健所黃夫人仲閣岳母也凡名家迹為延至率

認瘡後腹脹其中必有瘡母為祟也。諸消痞藥
嘗之不効。又以五皮飲利之。不應。將議攻下。而
予適至。觀其色黃。口渴。小便短濇。腹脹不可言。
足膝之下腫大不能行。兩腿腫連陰囊。氣壅工
能卧。飲食絕少。脉緩四至。大而不斂。予曰。此其
氣虛中滿症也。法當溫補下元。而無理脾病。無
可愈。若攻下。是殺之也。渠父與予厚。今官河東。
予安得不為渠任其重哉。顧歎友所用之劑。通
阜角。稭郎三。穠莪朮。羌黃。葶藶。子木。通枳。實者。

以厚朴山梔大黃牽牛黃連等皆破敵有餘之
品。見之且駭然。但黃夫人薦來之醫。又不能拒
止。躊躇間。幸渠廼伯溪亭公。知予心。卒謝歎醫
而一任予治。予即以人參白朮各三錢。炙甘草
五分。大附子炮乾。姜桂心各一錢。破故紙二錢。
桑白皮砂仁茯苓澤瀉各八分。水煎飲之。其夜
小水稍利。喘急稍緩。連飲五日。腹稍寬。皮作縐。
因食猪肚子太蚤。依舊作脹。前方人參白朮加
作五錢。再加陳皮八分。又二十劑而腹消其大。

半。廼能伏枕而卧。始能移步行動。改以參苓白
朮散加破故紙肉桂調養而安。溪亭公問曰。腹
脹如此。口渴如此。小便短濇如此。諸人悉認爲
熱。爲有餘。廼今以溫補收功。何也。予曰。公不觀
古人以氣虛中滿名鼓脹。即由氣虛所以成中
滿。設氣不虛。何中滿之有哉。且鼓者外皮堅緊
而內空。其若復瀉之。真元脫矣。安能復生。故
惟有補而已。口渴小便少者。皆元氣虛弱不能
運清氣不上升。故口渴。濇氣不下降。故無小

便迺天地不交之否。特補其下元。俾水火充
實。陽氣上騰。濁氣下降。中氣運動。而諸疾皆瘳。
也。六十九

朱懷仁。壯年客外。不謹。而生楊梅瘡。恐人知之。又
欲回家。迺求速愈。每日用藥外。燻燻而不効。用
藥水頻洗。洗而不瘳。迺以末藥點之。一日凡服
煎藥三帖。如斯兩月。不惟瘡不能瘳。毒且趕入
內。在下則肛脫二寸餘。周匝瘡滿如葦。弗克收
入。因而不能行坐。在上則毒入於肺。喘咳氣湧。

胸膈脹悶。不能仰卧。內熱而外惡寒。寢食俱廢。合目即譫語。陰囊疙瘩。紅腫脹痛。兩足瘡。延腫大。精神恍惚。軟床昇歸。廼兄少竹逆予為盼。六脉俱洪大。而數。語少竹曰。病至重。幸壯年。猶可治也。今予尚未可付藥。俟彼胸中瘀血毒物出後。廼可服。否則彼以予藥動血。而反致疑。願城中諸友。鮮有識此病者。一誤則大事去矣。慎之。少竹素信予。固請予藥。而不與其服。懷竹見予不發藥。廼與張程二公為治。晌午服藥。補

刻大發喘咳。吐出紫黑血塊如膿之類。梳餘。滿
房腥穢不可近。懷竹心慌。少竹慰之曰。毋恐。孫
君先已預言。汝胸中脹悶者。由燠藥逼毒入內。
上迫於肺。痰與瘀血壅遏肺竅。將欲成膿。故喘
咳不能伏枕。顙脉洪大而數。從可知也。必俟吐
後。乘而消之。極易為力。今果如孫君言。孫君藥
具在。急煎飲之。藥用牡丹皮。桑白皮。白蘚皮。木
通。前胡。枳殼。桔梗。甘草。杏仁。以仁葶藶子。服後
大便裏急後重者二十餘次。所下黑紫膿血甚。

多喘咳稍定。痰紅稍淡。二三劑。迺能伏枕而睡。
改用白芍、當歸、白鮮皮、甘草、貝母、黃連、金銀花、
皂角子、以仁、麥冬、木通、連飲二帖。足上跟踝瘡
腫漸消。其夜陰囊出臭膿血二碗許。次早診之。
兩尺脉不洪大矣。仍用前劑加丹參。又二帖。陰
囊結靨甚厚。橫裂一縫。三日後。隨縫連皮落下。
約重五六兩。厚可半寸。色如猪肝。洞見兩陰子。
系一光薄白胞。令人駭然。此亦亘古稀見者。
舉家謂陰囊。迺致命之所。且未有子。今爛去。即

使復好亦不能育子矣環哭甚悲予諭之曰此
毒去也而真元不傷吾能使其生肉如故亦不
妨於生育毋過慮焉舉家將信將疑予即用紅
粉霜加生肌末藥敷上一日三次並不作痛膿
水立乾外以人參當歸酒炒白芍白芷甘草白
鮮皮阜角子以仁何首烏調理一月囊肌全生
諸症悉愈迺令日用土茯苓猪肉各半觔同煮
極爛將肉入醬盞如常灑食之湯當茶飲脫然
全瘳次年生女七十

查良本兄令眷怒後偶食魚頭骨梗於喉中即以
饅頭粽肉等壓之骨雖下便覺胸膈不快又服
消骨藥兩日迨今廼七日矣胸膈脹痛殊甚飲
食悉從背後而下惡寒發熱六脉絃數予思骨
梗之後用硬物壓之傷其胃腕必有瘀血停蓄
膈間將食管逼在背後故飲食覺從背後下也
今但消去瘀血使食管復原胸膈之痛可瘳矣
藥以五靈脂為君山查玄胡索桃仁枳壳為臣
赤芍藥牡丹皮香附山慈仁為佐紫胡石菖蒲

為使水煎。臨服入韭菜汁一酒杯飲之。其夜胸
膈寬快。大便瀉一次。痛減大半。飲食迺從右邊
而下。右邊胸喉稍痛。吞物甚艱。苦吐出痰皆血。
腥氣改以山梔赤芍藥歸尾桃仁劉寄奴五靈
脂牡丹皮穿山甲煎入韭菜汁服之。兩帖全瘳。
七十一

後溪大兄孺人戴氏。勤篤嚴謹人也。秋患痢。所下
皆血。及屋漏水。內有血子如赤小豆者。不可計
數。晝夜五六十行。裏急後重。噤惡不住。穀者五

日。予以劉守真芍藥湯與三劑而病無進退。適
後溪兄在浙。姪女輩素信醫博黃氏為女科專
門。延而治之。授以芩連枳壳。換郎山。梔地榆黃
栢。滑石之類。服已五日。始雖噦惡。一日尚有梳
弱。今則粒米不能進。腹痛轉加。必用重物壓之。
迺稍定。神思昏弱。卧不能起。下午發熱。女科仍
以前劑加青皮枳實。姪孫爾嘉持藥見予曰。家
姑酷信黃醫為專門。今已任事五日。較前精神
大瘳。叔翁為祖父至交。寧無一語啟愚乎。予曰。

吾非不言。欲詆黃。恐為妬婦之口。今子來。予可
胥之。六脉滑大無力。胥畢。慌語爾嘉曰。事急。可
速令人促廼祖歸。否則令姑女流。不諳醫藥。吾
安能施其巧。比有西席汪帶川聞之。決爾嘉曰。
此事極要調停。留黃醫以安女流心。黃發之劑。
關而不進。以東宿之劑作黃劑進之。內外無猜。
則安矣。予然其言。以人參白朮酒炒白芍各三
錢。炙甘草一錢。半炮姜肉桂各一錢。白茯苓陳
皮各八分。砂仁五分。大棗二枚。水煎飲之。噦惡。

減半。其夜痢減十之五。惟腹痛不甚。減次早。胗之。脉稍歛。黃醫以為渠功。大言自矜。藥仍以苓連之類。予仍以前劑。再加黃耆。其日下午始納粥一茶盞。腹痛漸減。又次晨。黃醫胗視。見夜來痢減其七。益揚揚得志。語左右曰。寒家業醫五代。但此大病。亦不多見。自以為非彼。亦無能治也。爾嘉詰曰。瘡痢亦尋常耳。何以為大。黃曰。丹溪云。下痢身涼者生。身熱者死。下痢純血者死。肝洪大者死。如屋漏水者半死。半生。今皆犯之。

故云云也。爾嘉曰：然則今日當用何劑？黃曰：劑已投病，仍當確守前方，何敢輕改？爾嘉嘆而點首。復向予求劑。予以理中湯倍加酒炒白芍藥，以肉桂佐之。腹痛身熱悉愈。痢十去九矣。後溪兄亦浙田。爾嘉述病源以黃方。予方呈看。後溪唏噓嘆息。廼辭謝黃而詰予曰：人言下赤痢者熱。噦惡者熱。又身熱脉大。吾弟何獨認為寒而用此大熱之劑成功？曷故哉？予曰：此虛虛實實之處。極能誤人。尊嫂之熱，非真有餘之熱。廼內

有虛寒逼其虛火上行故噦惡潮熱耳脉大而無力仍作虛看且向服寒涼不効當自知警也後溪兄曰微弟幾敗廼事矣

七十二

邵敬園令眷常胃脘痛由氣鬱而起近以產後下痢紅白而胃脘之疼不止汗多六脉滑大無力法當收斂以小建中湯為主白芍藥酒炒四錢炙甘草一錢半桂皮五靈脂醋炒各一錢香附糖氈子各八分水煎飲之痛減汗未全斂次日前方加御米壳醋炒過一錢兩帖全止

三十七

蘇文學望臺患瘧。一日一發。先寒後熱。熱多寒少。胸膈痞悶。口渴。小便溷濁。腥臊不可近。醫五越月不効。面黃肌瘦。飲食減少。喘息呻吟。精神疲憊。起須人扶。廼敦予治。脉得沉絃而數。公問曰。是瘧否。予曰。是公曰。吾聞之。真病不治。治之無功。蓋真者死候也。瘧殆常病。不過寒熱虛實表裏諸名。家曾認為表症者。麻黃羌活柴胡等汗之矣。有認為裏症者。大柴胡湯輩下之矣。有認為痰飲者。常山訊石吐之矣。有認虛寒者。附子

理中湯人參服過三觔矣有認為實執用白虎湯枳實青皮枳即草菓消之矣盡法備嘗絕無一應瘡豈亦有真而卒至於死耶言訖淚潛潛下予曰觀公色脉瘡將發矣不暇辯第飲予藥不死也以柴胡滑石各五錢為君鱉甲三錢為臣黃連知母各一錢為佐枳實甘草各五分黑豆四十九粒為使水煎送下昆布鱉甲丸中刻至戌初便止公喜曰向者瘡發未申夜半尚不能止即止猶倦怠頗言適飲先生藥不兩時

而止。止便能言。先生之功也。予曰。偶耳。今日服藥已晏。明日五更。早服之。服訖。竟日不發。又次日。前方加入參白朮。小水腥臊之氣已無。精神陡長。公又喜曰。兩日無苦。先生之功也。予曰。偶然耳。公曰。嘻。吾瘡幾半載。休歛之名。公莫不歷試。卒無影响。先生一舉奏奇。有而不居。益見所養不審。湯名何劑。乞指示之。以詔將來。予曰。公何以名為哉。老子曰。無名天地之始。矧醫亦道也。即道亦是強名。醫貴識病。苟識病。一二三

品便能成劑立功。經云。約方如約囊。又曰。方以
類聚。方憑病立。苟不識病。即盡本草一千六百
五十六品。併而服之。未見其益也。瘡固常疾。治
亦不易。仲景有言曰。治瘡當分六經。予謂即六
經之中。又各有寒熱虛實陰陽在焉。是六六而
三十六也。即三十六之中。又有挾痰挾食挾氣
者。稟弱者。曷能枚舉。人與天地陰陽一致。天地
變化無窮。人身災患不一。豈拘拘一百一十三
方。三百九十七瀉所能槩哉。王節齋曰。古人因

病以立方。非立方以待病也。斯言深得軒岐真
方大意。然予今日所用之劑和劑也。仲景謂汗
吐下後而邪熱不減者。是為壞症。以小柴胡湯
加鱉甲治之。予特倣仲景小柴胡例。加益元散
徹邪熱。從小便中出。鱉甲雖治壞症。又能截瘧。
公曰。噫嘻。前此諸公看病。不過曰寒曰熱曰虛
實而已。未嘗有此眇論。誠空谷足音也。吾聞先
生從祝令君潘去華輩六邑會中討究理致。又
曾覽先生序大易穀序翼飛。通知先生融三教。

而萃於醫先生之醫得之於性命竅中故能全
人性命也有如此七十四

一汪氏姬寒痰壅滯於背胸脇腹皆脹痛小水頻
數先與女金丹以治胸脇之痛以二陳湯加益
智仁香附白芥子青皮柴胡蒼朮桂枝一帖而
小水減半次日以白豆仁易益智仁以枳壳易
青皮再加川芎桔梗開提清氣諸脹痛悉減七

十五

八塘徐公諱客者其子弱冠肌肉瘦削尻膝腫大

手肘肩頸皆腫。腫處皆痛而發熱。時醫有作風治者。有作濕痰治者。有作鶴膝鼓椎風治者。愈治愈重。伏床蓐。奄奄一息耳。舉家窘皇而決之。著。操者釋策曰。易象可不死。天醫上卦。弟遠在東方。相去百里而遙。迎而治之。無恙也。因訪予而迎之治。予診其脉。六部皆絃。觀其色青而白。飲食少。時當長至。予曰。此筋痿症也。書云。諸痿皆不可作風治。病勢幾危者。以前藥皆風劑耳。風能傷血。血枯則筋愈失養。况絃脉廼肝木所

主。攬前而至。是肝有餘而脾土受敵。脾為所侮。宜飲食少。肌肉削而熱將危也。內經曰。諸痿獨取於陽明為治。陽明者。腸與胃也。法當滋補腸胃。俾飲食日加。五臟六腑有所稟受。營衛流行。氣煦血濡。調養至春。淑氣司令。君火主事之時。宗筋潤而機關可利也。病者年雖少而能聞言相信。懇予為治。予立方五加皮以仁茸草蒼耳子枸杞子田陽人參杜仲黃柏白朮防風服二十劑而精神壯。腰腎健。飲食加。惟間或夢遺則

為減去杜仲而加遠志當歸二十帖而全安矣
此余初發之治也。七十六

卽耆諒老封君思翁年過古稀。右手足麻而無力
不為運用。足不良於行。以六君子湯加川芎當
歸以仁大附子鹿角膠黃耆桂枝兩劑便能步
履。四劑手足強健。每隆冬必服十數劑。則精神
加。飲食美。睡卧亦安。翁喜語曰。吾得君方。服之
可不杖。君劑當我几杖乎。嘻。七十七

太塘程巢父文學廼郎諱萬里者。年十五。夏月患

痢族醫為治彌月。痢止而筋骨腫痛。痛處發熱。
晝輕夜重。肌肉消。飲食少。煩躁。醫者以白虎歷。
節風治之。病劇而形削骨立矣。又有作鷄膝鼓。
槌風治者。法愈更而病愈甚。其家有程松者。
博洽嘉聞君子也。為巢父族大父。以余為吳。
治多奇中。命巢父迎予。予至。診之。脉皆無。謂曰。
此痢後風也。蓋由治痢不善。以致寒濕凝滯。凝。
滯經絡。日久氣血為痛所傷。此症虛虛實實。極。
難認。而措藥不易。欲補虛。則腫愈劇。欲疎通。則。

痛愈甚。惟局方大防風湯可愈此疾也。防風熟地黃。著人參。白芍。當歸。杜仲。各一錢。白朮一錢五分。羌活。牛膝。甘草。回陽各五分。川芎七分。加姜三片。水煎服。服三十帖而愈。

按局方云。痢後脚緩痛不良於行者。名曰痢風。或兩脚腫痛。足脛枯腊者。名曰鶴膝風。併一切麻痺痿軟風濕挾虛之候。服之其効如神。余故用之。亦謂治氣血兩虛挾風氣而成痿廢者爾。非謂可併治初起有餘之疾也。七

葉潤叁年近四十。心高嘈雜。好啖肉。尤好鷄。一日
不能缺。缺即身浮力倦。神魂無措。必急得肉。迺
已。見則大嚼。及入腹。腹又大痛。痛極則吐酸水。
稠涎然後定。稍定又思肉啖也。其痛苦之態。喊
叫之厲。難狀。見者酸鼻而潤。叁則其心為事人
咸以為祟。或有諭之者曰。古云與其受病。而受
病。孰若絕肉。以無藥。此病脾虛。以入難化。故
以作痛。此病入。子且。夫獨不慎何。

哉。潤全曰：吾豈不知絕肉之為愈也。蓋病雖在，尚能噉。若嚙噉則遍身活潑，蘊蘊左右，無可奈何。手足無所把握，頃刻不能自存，有近於死不能熬。急需肉少，豈忍口求痛哉。不得已也。廼翁延予為診。六脉大小不等，觀其色唇紅，臉黃。予曰：據色脉，廼虫症，非崇也。予能拯之。先與雄黃丸一服，不瘳，改以膩粉五分。史君子未一錢，用鷄子打餅五更，空心飼之。辰刻下長，繞十條，內有二大者，長尺有咫，自首貫尾，皆紅。下午

又下小虫百餘自此再不甚肉而嘈雜良愈

十九

程相如夫令政鄭氏孕踰七月因食冷患痢所下皆白膿腹痛後重小水不利兩關脉滑數以艾葉砂仁白芍藥白朮厚朴澤瀉滑石甘草與之痢如舊小水仍不通利夜更痢頻改用當歸白芍藥各二錢益母草酒連酒苓各一錢滑石三錢枳壳七分木香甘草各三分艾葉二分兩帖而安八十

太塘程晚山程松谷從弟也客湖州年四十懸弧
之旦湖中親友舉賀徵妓行酒宴樂月餘一日
忽言曰近覺兩手小指及無名指掉硬不舒亦
不為用口角一邊常牽扯引動幸為盼之六脉
皆滑大而數浮而不斂其體肥其面色蒼紫予
曰據脉滑大為痰數為熱浮為風蓋湿生痰痰
生熱熱生風也君善飲故多湿近又荒於色故
真陰竭而脉浮此手指不舒口角牽扯中風之
症已兆也所喜面色蒼紫其神藏雖病猶可治

切宜戒酒色以自保愛為立一方。以二陳湯加
滑石為君。苓連為臣。健脾胃消痰徹濕熱從小便
出。加胆星天麻以定其風。用竹瀝姜汁三拌三
曬。仍以竹瀝打糊為丸。取竹瀝引諸藥入經絡
化痰外。又以天麻丸滋補其筋骨標本兩治。服
二料。幾半年。不惟病痊。且至十年無恙。迨行年
五十。湖之賀者如舊。召妓宴樂者亦如舊。甘酒
嗜音荒淫而忘其舊之致疾也。手指口角牽引
掉硬尤甚。月餘中風。右體癱瘓矣。癱瘓俗所謂
半身不遂也。

歸而逆予。胗之脉皆洪大不斂。汗多不收。呼吸
氣促。予曰。此下虛上竭之候。蓋腎虛不能納氣。
歸原。故汗出如油。喘而不休。雖和緩無能為矣。
閱二十日而卒。八十一。

程曉山中風歸而逆予。胗時其子僅七歲中麻。

西吳

呼為瘡子姑。蘊呼為瘡子姑。沙子姑。一月餘矣。發熱如故。咳嗽聲啞。肌

削骨立。頭髮盡禿。衆醫束手。舉家亦墮泪而已。

余以胗曉山見之。曰。舉家驚惶。謂此兒不保耶。
此痺症。痺因麻後虛熱而發。以大薑會丸治之。

可獲萬全。君家初不問予者。謂予非幼科專門也。不知此特大方家餘事爾。為製藥服之。藥未盡而病瘳。松谷君語其鄉人曰。東宿公見病而決死生。治病而隨俗為變。一秦越人也。孫真人後身非耶。予聞之而三謝不敏。八十二

去予舍二里許。地名曰前坑口。一婦人。清明前十日發熱頭痛。醫者以九味羌活湯。十神湯進之。不効。而又加口渴。舌黑如煤。更一醫。以如神白虎湯。竹葉石膏湯進之。亦不効。而加洩瀉不止。

事昏沉四肢厥冷呼吸氣微米粒不進者十
四日其家為具含歛而待斃適予掃祖墓而近
其家其子聞之即告急於予懇為一診其脉細
如珠絲予曰此疫症也合理中生脉二湯飲之
連進二服夜半神氣稍甦飲粥湯半盞次早六
脉漸見予喜語其子曰可保無事書云脉絕微
續者生仍以前藥與之至晚瀉止口不渴舌心
焦燥退精神清爽駸駸向安矣再用人參白朮
各五錢炮姜炙甘草各二錢半麥門冬三錢五

味子十五粒。水煎。不拘時服。不數日而全愈。八
十三

族太學從獻長郎。七歲時。患痢紅白稠粘。而紅更多。飲食少。形氣弱。于時太學應南都試。其兄從明。雅知予。因逆予視。視畢。予曰。此不可以尋常治。治也。法當補。從明曰。語云。無積不成痢。故法先推。今不下。而遽用補。積何從去。予曰。足下論者常也。治病貴先察症。古人有先攻後補。有先補後攻者。因症投劑。不膠於常也。今形瘦體弱。

面色青。稟受大不足者。飲食又少。予故用補。欲使寧有餘。即不如意。猶可措手。若拘常法下之。倘有變。將柰之何。從明是予而索藥。即以四君子湯加歸芍黃連。山查與服三帖。而病無進退。婦道間有議予非幼科專門。今更請夏氏。夏至即語予先不下而用補。以致遷延如是。夏曰。幸不下。若下。今不可為。叩其故。曰。丹溪云。大孔如竹筒者不治。今肛門有竹筒狀。豈可下。然亦不必補。香連丸六一散可愈耳。三服而痢愈。頻其

痛愈甚。又加惡心而神氣憊。又更請汪恒春。汪至亦以香連丸黃芩芍藥湯與之。痢下日夜不可以數計。飲食不入口。婦道信耳。謂二氏有時名。故逆迎之。獨從明持議。復逆予。予往觀其形。神大非昔比。知中氣虛極。非理中湯不可。用人參白朮各二錢五分。酒炒白芍藥白茯苓各一錢。炙甘草炮姜各八分。肉桂三分。四帖痢即減半。前方減其半料。又六帖而飲食進。痢亦止。稠粘雖無而血水日夜仍三五行。肌肉亦未生。予

忘其故。必痺疾從虛而動。用如聖丸以治痺。病則全瘳矣。八十四

族姪孫子忠患痢於湖之東雙林。腹大疼。日夜行百餘次。下皆紅膿。狀若腐爛魚腸。絕無糞。夜而喊叫聲震中外。由孟穉飢飽後倡家縱慾而得也。一病即伏枕已十日餘矣。予時寓雉城。相去百里外。渠叔少喏邀予往視。盼其脉皆緩大無力。始用芎歸各五錢。加人參白芍藥桂心木香黃連服四日不効。改用膠艾湯亦不効。大孔狀

如竹筒物食而下不變色猶原物予思之此脾
經為寒濕所傷脾不裹血故也非附子理中湯
加肉桂南菓不可進五六帖痢始減半飲食稍
進但所下穢惡仍若前狀亦無糞渠父仲珪家
屏間報即徧訪徽之名家僉囑以切勿用補魚
程而抵茗城微虞番款因詢近用何劑微虞曰
聞用附子理中湯人參每帖三錢神效數而墮
道亟馳見予潸然泪下言曰姪五旬僅此一
症危如此望予曰郎君險過春

後何憂亦以侄尺此子故殫心力相扶也仲珪
曰離家而徽之各公俱囑以勿輕用補侄故無
程而來竟以補收功非叔幾於誤事吾見自今
以往之年皆叔之賜侄父子何以報効予曰治
疾如救焚醫家分內事矧屬在宗鄰且無德我
之望又何望報第雉城之約不可失若浼李鍾
泉邀兵輩齎代視數日俾予得踐雉城之約庶
兩盡矣而吳子疑而辭曰病者危在旦夕何孫
公欲自脫手而愚我被惡聲也予聞而哂之曰

見何鄙哉。丹溪有言。虛而痢自此。病者再五日。可脫然矣。予亦暫留。即以東垣和中勝濕湯與之。服七日。即衣冠出市。報謝四鄰。吳見之而悔。李鍾泉斬之曰。孫公欲成爾名。爾欲自沒沒也。悔之何補。吳繇是改容相敬。令其弟遊予門。彼亦納交予。而稱莫逆。子忠之始病也。其友李鍾泉重交誼。日夕省候。督其僕事湯藥。毋許離畦步。所下穢物腥臭不可聞。皆用漆布拭之。晝夜用數十觔。悉其滯浣了無難色。兩月如一日。

也。此友亦今時所希覩者。因併記之。以著其高。
八十五

余侄元素內人。季夏難產。夜過半。亟叩予門起而
問之。為產者急矣。曰。然作何狀。曰。產已及戶。不
能下。用力則胸膈間有物上衝。痛不可忍。予思
少頃曰。此必雙胎。胞已分而一上一下也。及戶
者。在下欲產。在上者。以用力而上衝。惟上衝。胸
膈故痛也。執亦險矣。迺諸書如產寶良方。胎產
須知。與各大方家。俱未論及。將何以處。因詳思

其治法偶悟必安上而下始用力產也。即取益
元散一兩與之。令以紫蘓湯送下。囑必如法飲。
藥入腹而胸膈痛止。不逾時產二女。母亦無恙。
予仲子泰來問曰。益元散非產科急劑。何能取
效。如是予曰。紫蘓安胎下氣。滑石滑以利竅。亦
催生之良品。蓋醫者意也。予亦以意裁處之耳。
此法方書無載。故記之以備專女科者采而用。
馬八十六

有邵兄而諱馬者。年五十。患嘔吐。吐物如爛猪肺。

狀胸背脹。市上諸醫。皆以翻胃治之。不効。而反加潮熱煩躁。飲食不入口。歟。醫謂肺壞。辭去不治。延予治之。診其脉。兩寸滑數。左關尺澁。予曰。此瘀血痰飲症也。非肺壞。果若肺壞。聲音當啞。今聲嘹而獨胸背作脹。瘀血痰飲明矣。此症殆繇酒後怒發所致。蓋肝藏血。脾統血。酒傷脾。怒傷肝。以故不能藏。不能統。血隨氣上。積於胸膈。必吐出而脹斯寬也。法當消瘀血。調氣化痰氣。調瘀消。則新血始得歸經。大本端而病根可除。

矣。迺為立方。滑石三錢。甘草五分。茜根二錢。小
蓳一錢五分。桃仁。貝母。歸尾。香附。各一錢。山梔
仁。枳殼。桑白皮。各八分。服十帖而全安。八十七

許卓峰者。多酒多怒人也。上吐血。下溲血。咳嗽聲
啞。族醫皆以為癰。辭去不治。迎予診之。其脉左
關弦大。右寸下平。指壘壘如薏。以予狀。予曰。此
有餘症也。作癰治者非。客有辨之者。謂此症人
皆認為癰。而先生獨謂非癰。然何以失血而聲
啞也。予曰。其為人也。好酒。酒屬濕熱。而助火生

痰火性炎上。迫肺不降。積而生痰。壅於肺。竅肺
屬金。主聲。書云。金空則鳴。金壅塞而不通。故啞。
此痰壅之啞。非肺痿之啞也。其性又多怒。內經
曰。怒則傷肝。甚則嘔血并下洩。蓋血隨氣行。氣
妄動。血隨之亦妄動。而不歸原。故上吐而下洩。
法宜清熱開鬱。化痰導血歸原。不半月而病可
瘳也。若認為瘵。而以地黃天麥門冬牛膝山茱
萸之類。將其其塞而益其熱。聲音何由而開。血
隨氣行。氣不清。血又何得歸原哉。諸君試觀之。

予用滑石青蒿鮮酒熟為君。貝母鬱金山梔仁
香附開鬱為臣。杏仁桔梗同貝母化痰為佐。丹
皮丹參小蘗甘草導血歸原為使。服十帖血果
歸原。又以貝母一兩童便浸一日為末。柿霜等
分。時時抄舌上化下。五日而聲音開曉矣。計期
不出半月。八十八

次嫂鈞孺人。年六旬。孀居已十餘年。患痢赤白俱
下。腹微痛。晝夜二十餘次。嘔吐痰涎。粒米不入
口者兩月。日惟用薄白酒打鷄蛋吞飲之。肌肉

盡削諸藥不効。予歸診之。六脉滑數。知濕熱痰火所致。以二陳湯加益元散。姜汁炒黃連黃芩。服幾四十帖。而嘔止痢瘳。其病亦幾危矣。予爲治者。恃其神存。惟神存。雖形氣不足。不食。猶可不死。此亦醫者當察也。八十九

邵秉儀。夫令眷。咳吐紅痰。或如桃荖膿色。前後心稍脹疼。面寸脉洪滑。此痰血痰火鬱滯肺之氣道。而欲成肺癰也。治當調氣化痰。兼消痰血清利肺金。以山梔子牡丹皮貝母桑白皮赤芍藥。

麥門冬各一錢。白滑石三錢。茅草根五錢。小薊二錢。甘草五分。枳殼八分。四帖而瘳。九十

程玄祖兄春瘟食復人事昏沉內熱口渴舌如焦煤。脇痛耳聾。身熱如火。僵硬不能轉動。屍寢者十日。口中喃喃。蓋夢語也。城中時疫正盛。親戚咸不弔慶。予為脉之。左絰數。右洪大而數。以葦胡石膏各五錢。黃芩知母葛根各二錢。山梔子枳實各三錢。甘草五分。連飲三劑。額上微汗。腹中雷鳴。其夜大便瀉三次。皆清水。熱仍不退。次

早脉之。右寸稍軟。前方加人參七分。又二帖而汗出熱退。身仍僵。口仍渴。耳仍聾。瀉亦不止。汗亦不收。四肢如冰。勺粒不進者已十三日。人皆以為死矣。予獨不忍棄。以人參、麥門冬、白芍藥、石斛各一錢、五味子十一粒、當歸八分、桂枝三分、黃芩、甘草各五分。後再診之。左脉已弱。咳嗽、人事漸爽。粥飲稍進。廼能開目發聲。瀉已止。頗可轉身。終有生氣。後以四物湯加以仁、甘草、陳皮、白朮、石斛、百合、貝母調理一月全瘳。九十一

汪郎兄腹痛嘔吐不止。城中諸友畢力醫治不痊。予為脉之。早晚大小緩急不一。知其為重痛也。以乾姜枳即蒼朮各一錢五靈脂三錢烏梅三個。川椒三分水煎飲之。痛吐立止。九十二

查景川兄遍身癩瘡紅而掀痒。諸君以白芨藜荆芥升麻葛根玄參甘草石斛酒苓甘草與之不愈。又謂為風熱以玄參蟬退赤芍藥羌活防風甘草生地當歸升麻蒼耳子連翹服之。飲食頓減。遍身發瘡痛痒不可言。予脉之。兩手俱緩弱。

以六君子湯減去半夏加白扁豆砂仁以仁山藥養耆黃耆一飲而飲食進四帖而痛痒除十帖瘡疥如錢九十三

程玉吾內人姓已七月乳忽紅腫而痛洒浙惡寒發熱而成內吹以大瓜萋四錢為君當歸尾二錢為臣甘草節蒲公英貝母連翹各一錢二分為佐青皮柴胡各八分橘葉五片為使水煎飲之兩劑而瘳此方治驗不可勝數緣婦女恐鬱肝經為多故瓜萋甘草為緩肝之劑貝母開鬱

連翹蒲公英解毒。紫胡青皮調氣。橘半。紐當歸活血。血活氣調。毒解熱散。而腫痛消釋也。若將成膿。可加白芷。九十四

一黃氏婦。青年初姓。已及彌月。忽午夜口中啾啾。目作上視。角弓反張。裸裎不暇羞恥。口眼偏邪。昏憤不知人事。問之不能言對。舉家悚駭。予曰。此風痰為怒。肝動而成子癇。當從雲箕子葛根湯加大腹皮。一兩劑可愈也。方以葛根貝母丹皮防風川芎當歸茯苓桂心澤瀉甘草各二錢。

獨活石膏人參各四錢水煎飲之而甦

按貝母令人易產未臨月者用升麻代之九
十五

吳見南令郎心脾痛因勞倦而致每痛必得可口
之物壓之立止兩腿生瘡右脉滑左脉弱以白
芍藥三錢甘草一錢五分白芍藜碧胡麻各一
錢當歸黃柏各八分石菖蒲白茯苓各六分四
劑而痛止仍用小建中湯減去桂枝加黃柏蒼
耳子白芍藜何首烏煉蜜為丸服之瘡亦尋愈

又令卽八歲原有疳積疔痛。因幼科攻剋太過脾氣不足。面色青。以啟脾丸為主。藥用人參白朮茯苓甘草白芍藥山查澤瀉薏以仁白扁豆史君子薑黃雞肫皮。以神麴糊為丸。一料而瘳。九

十七

族侄女年甫八歲。腹高於胸。發熱面紅。咳嗽嘔吐。甚則連血噴出。右關脉滑大有力。此風熱羈絆於脾肺之間。而然以滑石二錢。枇杷葉一錢。炙

芽天麻半夏麴各八分枳實枳殼防風青皮各
五分水煎服之熱退嗽定吐亦良瘳九十八
從兄鎬年近五十左脇痛手足抽搐不能步履兩
手脉俱軟弱用當歸芍藥木瓜石斛蒼耳子
枸杞子各一錢薏以仁二錢人參牛膝各七分
陳皮白芥子各六分紅苓三分水煎飲之其夜
大便下黑血二升迺得睡痛搐俱緩改用人參
當歸芍藥各一錢二分薏以仁四錢牛膝木
瓜石斛各八分紅苓酒苓各五分其夜大便秘

有黑物從此精神和好寢食俱安後五日因為
怒忤且加食傷右手左足大搐左足大腿疼痛
縮而難伸伸則痛甚左脇極痛小便短用山查
青皮防己人參半夏麴陳皮以仁川芎蒼耳子
杜仲石斛以瓜蒌為君服下左脇痛止右手亦
不搐矣惟左大腿內股筋痛一搐則膝抵於口
此亦事之異者因改以人參當歸薏以仁甘草
黃柏白芍藥鈎藤牛膝木通山梔子諸痛搐悉
愈口亦不渴後只以此法調理五日隨能縱步

出戶九十九

一小童上達年十六忽面大腫足亦微腫喘息不安此脾虛濕氣壅盛所致消芩桑白皮防風葶子陳皮羌活升麻甘草澤瀉白朮此上下分消法也服後腫熱稍退但正氣甚虛以六君子湯加麦芽澤瀉調理而安一日因多飲食且感風寒痰涌吐逆見鬼面掉手足角弓反張唇口色黑熱極危急此癰症也以胆星半夏天麻僵蚕橘紅炙甘草枳實麦芽白朮紫蘊子杏仁煎

胡白茯苓姜三片水煎飲之一劑而愈此後再不復發一百

族侄良詮患血痢腹痛裏急後重時師治以香連丸黃芩芍藥湯不愈腹反增痛面赤唇紅有侶塗殊喊叫之聲四舍悚駭比有太學寧字者仁心為質人也憐其家貧莫砥拉予為脰六脉洪大伏於床間而眼泪而不能言太學會其意語予曰症誠急彼以後事無措而難於言予曰諾吾能起之以生熟白芍藥六錢生熟甘草二錢

乾姜肉桂各一錢。木香五分。棗二枚。水煎之。
飲竟啗馬而卧。太學心疑。歸囑家奴曰。倘有急
扣門可即報我。及明見無動靜。廼令人覘病者。
何若。復曰。夜來痢減十之五。痛減十之七。早間
已啜粥半盞矣。太學喜而叩予曰。渠面赤唇紅。
脉大所下皆血症。皆屬熱。叔廼復投熱劑。吾其
恐一夜不能寐。廼今疾已減半。生有望焉。不卜
今日用何劑。予曰。比昨劑差小耳。方仍昨也。太
學曰。吾惑矣。何視熱為寒耶。予曰。君知脉大為

熱不知大而無力。廼虛寒也。面赤唇紅。由中寒而火不能下。陰盛格陽之症。設是真熱腹痛。其人體仰而舒。寒則引而伏。所下血色帶晦。均是假熱寒症明矣。前劑果再進而全瘳。太學復書報予曰。昨聞虛實真假之論。非飲上池水者不能道也。幸註之以詔後世。一百一

婦年三十二。大發寒熱。胸膈有痰。大便秘瀉。以二陳湯加白朮桂枝白芍藥柴胡酒苓。一帖而止。後因怒。早晨又復發熱。吐血一盞。口渴汗多。

脉甚數。陳皮知母紫胡杏仁丹皮酒芩白朮人參烏梅青皮枳。即水煎服之。用此調理。數脉漸退。惟左脉尚絃。寒熱已止。喉中痰聲已定。後入因將息失宜。兩脇疼。痰多。嗽不易出。脉較前不甚數。以瓜蒌仁一錢半。貝母白芥子各一錢。蘿蔔子菴仁滑石牡丹皮香附山梔子各七分。青皮赤芍藥甘草各四分。煎服。血絕不來。嗽熱寢息而安。一百一

從弟婦程氏。右肋痛不能睡。背心疼。下午潮熱。胸

葛作梗。痰中有血。大便秘。用大黃以韭菜汁。蘿蔔汁。芎根汁。和勻。將大黃拌濕。炒乾。再拌再炒。如此三次。以黑為度。三錢。瓜蒌仁二錢。貝母。當歸。山梔子。丹皮各一錢。青皮。前胡。川山甲各六分。甘草一分。水煎飲之。凡三帖而瘳。丹亦不發。一百三

黃懷虛咳嗽嘔。不知饒餓。氣逆不調。不得仰臥。左脇亦不能。有席。唇曾吐紅。近又傷食。先以丹溪保和丸進。繼以穀芽。橘紅。白朮。枳實。半夏。

薤其草

百四

子茯苓杏仁桑白皮將養而安一

一族姊年近六十咳嗽口渴常吐涎沫用前胡知
母天冬粉白朮藥當歸甘草陳皮桔梗烏梅桑
白皮煎服諸症悉止後半年膝灣紅腫作痛大
便秘黃柏當歸生地紅芍葳靈仙羌活蒼耳子
五加皮防風以仁四劑全瘳一百五

族侄婦戴氏兩寸脉滑大兩尺沉微心痛徹背背
痛徹心甚則必探吐其食廼已近來每一痛必

七日。僅進白水。粒食不能進。進則吐而痛。更加。
七日。後痛漸已。如此者。十七年所矣。始則一年。
兩發。又一年六七發。今則一月一發。以積氣丸。
治之。不終劑而斷根。一百六

老僕來興。咳嗽。胸脇背心脹痛如刀。及所刺。發熱。
口渴。諸治不瘳。脉浮而數。此風寒鼓激痰火。上。
湧而然。以前胡。麻黃。紫蘊子。散風邪。為臣。以瓜。
蒞仁。治痰火。為佐。橘紅。半夏。旋覆花。杏仁。為佐。
枳壳。桔梗。甘草。為使。西劑而平。 百七

一婦生女不生子。多思多鬱。小便泌而不通。脹悶不安者二日。歛醫汪氏以備急丸進之。謂大便行。小水自利也。詎意大便行後。而小水點滴不通。脹悶益急。時刻不能存。將欲自盡。家人急予為治。予詢之曰。近來經水行否。答曰。行過十日矣。小腹腫大如一大西瓜之硬。自大便瀉後。疲困不足以息。勢若熾眉。予曰。此轉脾病也不急治則危矣。以補中益氣湯。酌服入韭菜汁一小酒杯。服訖。選有力婦人進房。令患者橫卧床間。

力婦以患者兩脚膝灣架於肩上。將患者下身
虛空提起。搖擺數四。俾尔呼倒上。徐徐放下。患
者去衣不及。小便箭射而出。熱如湯。黑如墨。頃
刻盈盆。小腹立消。而愈。後遇數人不拘男婦。皆
以此法治之而安。一百八

崑池太學內人患牙痛。一晚暈厥三次。次日兩腮
紅腫。痛不可支。且洒浙惡寒。寢食廢。以清胃湯
加石膏為君。白芷為臣。連翹為佐。北細辛為使。
飲下。痛頓釋然。如風滅燈之遠外。以明藥為茶。

大五倍子一枚。將礬裝入。以泔為率。炭火上炙焦。以礬紅枯為末。不時擦牙痛處。牙痛立止。此方多効。百九

一僕婦因產難。而子宮墜出戶外。半月不收。艱於坐卧。家貧不能求藥。憂恐成癰。鄰姬為訪之。專門黃醫博氏教之曰。此易事也。只須補中益氣湯一百帖。每帖要人參三錢。計二觔可收也。廼夫聞言。即大伸舌謝之曰。僕家朝傭暮食。無隔宿之儲。甌生蛛網者。半越月矣。安有人參二觔。

可服也。惟命是俟耳。嫗復向予言之。且告以醫博氏之治。予咲語嫗曰。審如彼言。貧家則盡俟命矣。又奚醫為。此必產時受寒。血凝滯。不能斂而收入。症雖名陰脫。未必盡由氣虛下脫也。觀其善食。而大小便如常。可知矣。予有一法。價廉而功捷。三五日可瘳也。用未經水石灰。幹一塊。重二三觔者。又以韭菜二三觔。煎湯置盆中。將小瘳投入。灰開湯沸。看沸聲盡。迺瀝去灰。帶熱於盆上。先薰後洗。即以熱韭菜於患處揉挪。

坐

孟石灰能散寒消血。韭菜亦行氣消血。一日洗
一次。如法洗之。初極爽快。洗三日。果消軟。收入
此予臆度之方。初不期捷効如是。里中聞之。咸
謂此方合命。名曰賽百帖人參湯云。一百十

族侄孫媳程氏。雙桂翁女也。年甫三旬。產曾五胎。
今則經閉不行者八年。肌肉則豐肥於昔。飲食
又倍加於昔。精采則艷羨於昔。腹柔不堅。略無
所謂病者。獨經閉不行。不生育耳。專科率用四
物湯。玄胡索。牡丹皮。諸通調之劑。計服千餘帖。

矣。又如三稜蓬朮乾漆桃仁蘓木之類。莫不藥
嘗。罔有一應。訪予為盼。六脉緩大有力。予曰。此
脾濕生痰。脂滿子宮。徒行血活血破血無益也。
法宜調氣消痰。燥濕熔脂。俾使清瘦。庶新飲食
不復生痰。不助肥脂。復為經水。經不期行而自
行矣。若彼專科者。流局局然。養血活血破血。而
欲望其經行。不亦難乎。蓋前劑皆滋濕生痰之
味。非有濕痰者所宜。而肥人尤不宜用也。迺為
訂一方。以平胃散加滑石桃仁黃連姜黃丹參。

南星半夏作丸劑服之。半年而經行。次年生一子。後又連生一子一女。一百一十一

熊成八官。江右南昌人也。早起行路。忽見邪火五團滾滾而來。大驚駭。次日腹中膨滿。漸成脹滿。面白皮薄。兩手瘦削。兩足皆有浮氣。按之實。臥不起。行動氣促。形神俱弱。醫謂神弱氣促。面黃肌瘦。胸腹青筋。縷縷如貫索。小水清長。形症如此。脾虛所致。以參苓白朮散投之。十日。堵然如鼓中有一塊。巍巍突出。堅若鉄石。臍已平滿。勻

粒不入。醫者復診與渠決曰。若疾法在不治。盡
早圖歸。毋作異鄉鬼也。病者聞言。汨歛歛下。蘇
東溪憐而懇予為診。脉沉絃有力。診竟。語渠曰。
審脉驗症。非氣虛中滿候也。前補太驟。適有助
長。顧今霽雨途遙。即歸。恐未能時刻可到。即到
又未必遇良手。治稍異。則大事去矣。予有一藥。
尚可冀生。東溪力為之請。以琥珀調中丸。日二
進之。一進甚其。再進稍快。十日腹漸寬。塊漸溶。
半月塊盡消去。青筋俱歛。改以平胃散。如蘇東

子姜黃以仁砂仁木香調養一月。飲食大加。帖然安寢。兩足之浮亦并消釋。一百一十二

從侄中叔太學。以暑月赴南雍。一日轉班出。索茶飲。飲輒逆流。左鼻出。茶入腹者十之三。當訝白下名家調理者盡其人。幾一月。不惟飲茶水為然。食粥與飯亦多從鼻出。太學生平喜精潔。日與交游皆縉紳達掖。遂以疾自慚。因告假圖治。聞京口多名醫。買舟訪之。如何。如張如團。無不謁治。然愈服藥愈病。漸加惡心頭暈。肌肉削。四

肢無力。心益惴惴。亟歸就予治。予胗畢。因叩所見。諸名公認何症。授何劑。中叔曰。諸君皆謂此疾。被籍無戴。治法無稽。徒揣度為胃火。謂諸逆上衝。皆屬於火。故授劑。非黃連解毒。即三黃石膏。梔子黃柏。知母天芩粉葛根之屬。任亦以初到白下。苦酒因酒動火。理或為然。聽其治。而不遑它計也。予曰。治病貴辨明經絡。與經絡之出納虛實。明藏象。察經度。究竟夫病機。病能與偏。謁所以隨俗為變也。何常拘拘守方書哉。內經

有云。咽喉者。水穀之道路也。喉嚨者。氣之所以
上下者也。頤頤者。分氣之所洩也。人之鼻淵涕
出不收者。頤頤不開也。子之症亦頤頤不開之
類爾。頤頤不開。故氣上而不下。會厭弱而不能
揜其氣。喉夫鼻與氣。喉相通。惟不揜。故飲食通
從鼻竅而出。不見常人偶氣逆而飲食自噴嚏
出乎。即其例也。且右脉緩弱無力。氣虛明矣。內
經云。形寒飲冷則傷肺。又曰。脾胃喜溫而惡寒。
又云。視聰明而清涼。香臭辨而溫暖。子多服寒

涼此所以惡心頭暈肌消也。予但為溫補。蓋肺屬金而主氣。金氣旺則收斂下降。氣下降則飲食從氣下矣。以六君子湯加葶藶桑白皮。以仁沉香一進而執緩。三進而止大半。七劑而全安。以此症舊無載。故筆之以俟後人采焉。一百一十三

程達庵四媳戴氏產半月而腿疼。迎專科診視曰。虛。投以八珍湯。服十日。疼益甚。予赴邑侯之召。道經其廬。達庵趨問產後半月而腿疼何症也。予曰。兩腿皆疼。獨一疼也。達庵曰。右腿疼。予問

疼處熱否。曰熱。予謂切不可認虛認風。此產後
敗血凝滯血海流於經絡。不急治則血無從出。
久必化膿成毒。或為腸癰。今腿痛是其徵也。速
庵默然而別。復迎專科。又曰風也。但丹溪有云。
產後須當大補氣血。雖有它症。以末治之。投以
十全大補湯。痛轉劇。大發寒熱。小腹近髀果紅
腫出膿。外科又為生肌收口太蚤。致腰俞復發。
一毒腫痛寒熱如初。十日後大潰膿而不收口。
精神委頓。肌肉陡削。飲食不進。惡心怯寒。晝夜

一息爾。外科曰：不可為也。專科曰：余但治胎前。
產後。今為腫毒所壞。皆辭去而不下藥。達摩始
悔不聽予言。以致悞事。因急予。予往視六脉。
大無力。澆口流清水而無膿。予曰：孰棘矣。
若疾速。急保脾。蓋五臟六腑皆藉脾土以養。
然非大劑人參附子不可。雖以人參白朮。
錢草。草乾姜。大附子各一錢。黃耆三錢。白朮
心各五分。以其能排膿止疼也。外科猶然。
白朮作膿。恐不可服。予曰：膿不死人。飲食

則死人也。急進之四帖而神氣回。飲食進。症悉減。瘡口成膿。予語之曰。生矣。改用參苓。術散調理一月而安。達庵叩予曰。公何預知。為腫毒當急治也。予曰。內經所謂臟象又云。症腿疼而熱。症已現矣。生於產後。非敗血所。而何於時急為疎通。不審經絡何毒之有。專不察而補。是益其毒而助之潰也。外科不審虛實強弱。然以毒治之。奈何不使患者幾危哉。達庵曰。專科之不足恃也如此。夫雖然。不如是無。

以見公之高矣十四

一